


外臺秘要

[H]

Chunéee

10

Vol X 1.26-1.28





唐王燾先生外臺秘要方卷二十六目錄

痔病陰病九蟲等三十五門

五痔方一十二首

五痔數年不差方六首

五痔脫肛方二首

腸痔方一十五首

諸痔方二十八首

痔下部如蟲齧方九首

大便秘下血風冷積年變作痔方三首

灸痔方二首

雜療痔方五首

脫肛方三首

肛門凸出方三首

卒大便秘脫肛方六首

腸肛俱出方二首

脫肛歷年不愈方三首

疝氣及癰方六首

卒病癰方五首

癰卵偏大方三首

灸諸癰方一十四首

陰腫方六首

陰疝腫縮方一首

陰卒腫痛方三首

陰囊腫痛方五首

陰下癢濕方七首

陰痛方三首

陰瘡方七首

陰邊粟瘡方五首

著硃砂方四首

九蟲方一首

五臟蟲方七首

長蟲方二首

蛔蟲方九首

寸白蟲方一十九首

蛭蟲方六首

三蟲方六首

雜療蟲方三首

尚德按方  
疑當作法

尚德按  
疑當作法

尚德按  
疑當作法





唐王壽先生外臺秘要方卷二十六

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進  
新安後學程衍道敬通父訂梓

五痔方一十二首

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時時膿血出者名壯痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛邊有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也若大便難肛良久肯入者名氣痔也此皆生中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不為患久久不差終能困人別有大方令單行亦要便宜依按用之肘後集驗同出第四卷中

廣濟療五痔方 生槐煎生槐煎五皂角二兩炙麝香研鰻鱧魚炙雄黃研茛菪熟丁香木香各二 右八味

搗篩以槐煎和丸分為五丸取一淨瓶可一升以來極地埋之著一壘子於瓶上鑄壘子作孔內大瓶中灰蓋之然後內藥一丸燒以下部著壘孔上坐便通汗其盡一丸藥即止內痔以藥一丸內下部立效仍不及薰忌魚熱麪等

又療五痔蝟皮散方 蝟皮炙龜甲炙當歸各六 槐子 大黃各八 蛇皮炙五 露露房炙五 藥本

桂心各五 猪後懸蹄甲枚十四 右十一味搗為散空腹以米飯服方寸匕日二漸加一匕半不利忌如

前方 又療五痔下血不止方 槐子 五色龍骨 柳葉炙乾 乾薑 芎藭 當歸 茜根 吳茱萸各六 白

欬 附子五分 黃耆八分 猪懸蹄甲枚十四 髮灰四分 右十四味搗篩蜜丸空腹以飲服如梧子二

十九日二漸加至四十九丸若利恐多意減之忌如前方出第四

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居血縱橫出方 赤小豆四分 黃耆二分 附子炮 白欬

桂心各一 芍藥 黃芩各二 右七味搗為散以酒服方寸匕日三止血大驗文仲同備急集驗同

外臺秘要 卷二十六 五痔方一十二首

如前方三 字宋本作 魚鱧七 字 如前方三 字宋本作 猪魚七 字 出字下宋

燒字下宋 本有之字



本有及商  
二字

九療下宋  
本有久字

商德按肚  
疑當作肚

同字下宋  
本有禁生

字  
冷魚肉五

本字上宋  
本有燒字

徐安以下  
八字本宋  
大書

商德按千  
金三指上

有方字一  
權作雞子

大宋本作  
雞子大補

生作消  
生冷下宋

又方 藜蘆 大黃 黃連各半 練木子十四枚 桃仁十四枚 巴豆四枚 去草麻十四枚 右七味咀

以豬肪一升煎三沸下去滓傳贅肉上日三外著此膏內服紫參九常併行駱吟錄

又療五痔大便肛邊清血出紫參九療不差服之無不差方 紫參 秦光 亂髮灰 紫苑 厚朴已

上略藥本二雷九 牡白芷兩 盧蠶半兩 貫衆三兩 猪後懸蹄甲十四枚 蟲半兩 石南半兩 右十三

味鴉歸以羊脊骨中髓合猪脂各半升煎和丸如梧子末食酒服十五九日再亦可飲下劇者夜一服

四日肛邊痒止八日膿血盡鼠乳悉愈滿六十日終身不復發久服益善有痔病十八年肛出長三寸

服此方即愈亦療脫肛有人熱可除羊髓以赤蜜代集驗備急

集驗療五痔有氣痔溫寒濕勞即發蛇蛻皮主之壯痔生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣翹甲主之

批痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血蛻皮主之腸痔更衣挺出久乃縮壯猪左懸蹄甲主之腸痔更

衣出清血蜂房主之方 右所主藥皆下篩等分隨病倍其所主藥為三分旦早以井花水服方寸匕病

甚者旦暮服之亦可至四五服唯得食乾白肉病差之後百日乃近房室又用藥內下部有瘡內中無

瘡內孔中千金附紫

又方 野葛末 右一味以刀圭內藥中服五日知二十日差三十日愈按安用之

又方 煮槐根洗之又煮桃根洗之千金備急同並

刪繁療五痔桃葉蒸痔方 桃葉解細糠 胡麻各一 右三味合為一家蒸之取細糠熟為度內小口

變中將肛門坐桃葉氣熏入肛門蟲出當死出第十

千金療五痔方 蛻皮三指 熏黃如棗 熟艾握 右三味穿地作坑調和取便重之取口中熏黃烟氣出

為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹饌將補慎雞猪魚生冷

又方 桑耳 右一味作羹空腹之飢飽食之三日食之待孔卒痛如鳥喙取大豆小豆各一升合搗作

兩囊中蒸之及熱更互坐之即差並出第二



本有二十  
日內補之

六字  
尚德按千

金大小豆  
藥法別為

一方家作  
升升作斗

宋本無一  
名概子四

尚德按千  
金同千金

翼無白飲  
止十五未

尚德按千  
金酒服千

尚德按千  
金無概白

皮止三味  
外臺蓋按

千金翼  
又按千金

槐東南根  
二斗漬作

清二斗作  
二十斤清

作濁  
下字下宋

本有以大  
骨萎補之

六字  
三服下宋

本有忌銘  
由生忌五

五痔數年不差方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔痔有雌雄為病若暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩痺者三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之即發方 槐子 乾漆 熟椒 木根皮 各四兩

子即 榮 灸 春 光 黃 荬 白 斂 青 木 香 壯 蠟 熟 龍 骨 附 子 炮 者 雷 丸 蒺 藜 子 白 芷 桂 心 雞

舌 香 兩 各 二 黃 香 兩 右 十 六 味 搗 篩 蜜 和 為 丸 一 服 二 十 九 日 三 服 千 金 翼 同 十 金 翼 有 丁 香 菜

千金小槐實丸主五痔十年方 槐子 三 龍 骨 十 礬 石 燒 硫 黃 各 一 白 糖 仁 大 黃 兩 十 乾 漆 熟 右 七 味

搗 篩 石 二 種 及 糖 並 細 切 內 銅 器 中 一 石 米 下 蒸 之 以 絲 絞 取 汁 以 和 藥 合 作 丸 併 手 捻 之 丸 如 梧 子

大陰乾一服二十九日三服 深師 槐 東 南 枝 細 切 槐 東 南 根 細 切 槐 白 皮 石 一 槐 子 石 一 右 四 味 大 釜 以

又槐酒主五痔五十年不差方 水 十 六 石 煮 取 五 石 澄 取 漬 更 煎 取 一 石 六 斗 炊 兩 石 黍 米 上 麴 二 斗 釀 之 槐 令 調 封 泥 七 日 酒 熟 取

清飲日三四適寒溫量性常令小小醉耳合時更煮滓取汁搗米洗器不得用生水此藥忌生水故也

深師並 翼同 又方 塗 熊 膽 取 差 方 止 但 發 即 塗 一 切 方 皆 不 及 此 救 急 并 翼 同 並 出 第 二 十 四 卷 中

古今錄驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生瘰癧肛中此壯痔肛邊生乳此壯痔皆飽勞氣

所生方 大 黃 如 金 色 十 兩 滑 石 碎 兩 芒 硝 兩 三 桑 白 皮 兩 二 棗 枝 三 十 黃 芩 兩 五 杏 仁 兩 二 右 七 味 切 以 酒 一 斗 二

升煮取二升盡服之當下 又療十年痔如鼠乳膿出便作血劇白斂散方 赤 小 豆 四 黃 荬 各 三 芍 藥 各 二 白 斂 仁 黃 芩 各 三 桂 心 三 附 子

炮 壯 蠟 各 二 右 八 味 搗 篩 為 散 酒 若 泔 汁 服 方 寸 匕 日 三 服 並 出 第 三 十 卷 中

五痔脫肛方二首 千 金 療 五 痔 脫 肛 槐 皮 膏 止 痛 痒 血 出 方 槐 白 皮 兩 二 黃 草 辛 夷 甘 草 白 芷 各 半 野 葛 粉 巴 豆 七

五痔數年不差方六首 五痔脫肛方二首



尚從六  
枚千金作  
十枚宋本  
中下宋  
本有黃草  
肝後作黃  
淮七字  
尚從六  
字下疑脫  
驗字  
發字下宋  
本有忌粘  
肉冷水五  
字  
中下宋  
本有崔氏  
用鯉魚五  
字  
尚從六  
字下疑脫  
驗字  
病字下宋  
本有至公  
傳將服勿  
止七字

去漆子六桃仁十枚猪脂半斤右十味切以豬脂煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死差  
止痒痛大佳出第二十卷中

必效五痔脫肛方 以死蛇一枚猪大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑上坐蟲盡出張文仲處出第六卷中  
腸痔方一十五首

肘後療患腸痔每大便常有血方 以蒲黃水服方寸匕日三差備急文仲崔氏千金古今錄同

又方 礬石熱附子地各一兩右二味搗篩蜜丸如梧子服二九酒下日三稍增宜日永差不發備急文仲崔氏千金同

又方 以鯉魚作鱸蓋盡食之任性多少良崔氏用鱸魚

又方 常食鯽魚羹及蒸隨意任之備急文仲同並出第三卷中

文仲療腸痔方 以槐木上耳搗末飲服方寸匕日三肘後古今錄千金同

又方 白薔薇根 枸杞根各二分 右二味搗篩為末服方寸匕日三五六日當更小腫是中病崔氏備急

又方 生地黃一斤 酒半 右二味以酒漬地黃三日隨意飲多少即差肘後備急

又方 取枳根皮末飲服方寸匕日三亦可煮汁常飲附後備急崔氏皆同

備急療腸痔方 以穀子燒末敷之深者導之文仲崔氏同

又方 以槐白皮一擔剉水煮令濃脫衣入中坐當如欲大便狀冷更易不過三蟲出

又方 搗槐白皮作屑粉以導之崔氏文仲千金必效同

又方 以繫莖燒灰礬石熬和為粉粉之崔氏文仲崔氏同出第六卷中

刪繁療肺虛勞寒損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有核痛寒熱得之好挺出良久乃縮而瘡生豬懸蹄

青龍五生膏方 豬懸蹄甲三枚 生梧桐白皮兩生龍膽分生桑白皮分 蛇脫皮分雄黃分生青竹皮分 生柏皮七分 露蜂房炙 蜀椒汗各三分 附子地各四分 杏仁去皮 右十三味細切綿裹以苦酒二升



二服下末  
本有忌猪  
雞酒髮生  
冷魚油膩  
等十一字  
減字下末  
本有不利  
忌麝猪肉  
魚蒜陳臭  
物十一字

大驗下末  
本有忌猪  
肉冷水五  
字

尚德按糯  
千金作糯  
高德按糯  
千金作糯  
金無涎字  
庭作宅

浸一宿於火上炙燥搗篩以豬脂三升和微火煎之如薄糖數并酒服如棗核出第七卷中  
崔氏療大便秘後出血此腸痔之疾宜服薤白湯方 薤白切七 羊腎脂升 右二味緩火煎令薤白黃去滓

頓盡未差更服即止得膿血與糞相和即差

又方 白礬燒汁 附子地 乾薑略一 右三味搗篩蜜和飲服二九至三九日二服並出第四卷中

諸痔方二十八首

廣濟療痔下血方 以蛇不問多少煎煮肉消盡去滓用汁和婆羅粥著少鹽食之大效一無所忌

又黃耆九方 黃耆 枳實炙 烏蛇炙 當歸 赤石脂略二 蝟皮炙 右六味搗篩蜜丸空腹酒下

如梧子二十九日二服更不加減並出第四卷中

范汪療痔下血黃連麴散方 黃連兩二 麴兩一 右二味搗篩薄蜜搜洗食以飲服五分匕日三不知增至

方寸匕

集驗療痔蝟皮丸方 槐子三 附子兩二 當歸兩二 連翹兩二 乾地黃兩五 乾薑兩二 礬石二 兩燒 續斷 黃耆各

兩 蝟皮熱 金細切 右十味搗篩蜜丸飲服十五丸如梧子日再加至三十九亦可主瘰癧常用大驗附後

備急大仲則藥千  
金古今錄驗同

又方 以生槐皮十兩削去黑皮熟搗丸如彈子綿裹內下部中大效備急千金

又方 以槐赤雞一斤為散飲服方寸匕槐雞也

千金療痔神方 以七月七日多採槐子熟搗涎取汁重綿絞內銅器中盛庭中高門上暴之二十日以

上煎成取如鼠糞大內穀道中日三亦主瘰癧及百種瘡救急崔氏古

又方 鯉魚腸三具以火 右一味以綿裹內下部中一食頃蟲當出魚腸數數易之盡數枚當差一方

云坐上蟲出古今錄

又方 虎頭骨炙 犀角 右二味各為末如雞子大以不中水猪脂和塗瘡上即差救急深師同並出第二十四卷中



崔氏療痔方 崔林草 粗切 右一味以水二大升煮取一升頓服盡三日重作一劑無不差者

又方 取駱駝頷下毛燒作灰可取半雞子大酒和頓服之 並出第四卷中 必效熨痔法痔頭出或疼痛不可堪忌方 取枳實燒灰中煨之及熟熨病上盡七枚立定發即熨之水

除也

又方 以麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人著亦佳其痛不可忍者不過兩度永差

又方 以野豬肉炙食十頓即差三方云奇效

又方 取五月五日蒼耳子陰乾搗末水服三方寸七日三差乃止

又方 以二十年久鐵線袋口燒作灰分和水服

又痔正發疼痛方 以葱和鬚濃煮湯置盆中坐浸之須臾即當痛止

又方 以狸肉作羹食之或作脯食之不過三頓無不差

又方 以肥大棗一顆剝去赤皮取水銀掌中以唾研令極熟塗裏臍上內下部中差

又方 以篇蓄根葉搗汁服一升一兩服差

又方 薑屑兩 右一味以水三大合煮之取一合去滓煖空腹服隔日再服忌豬肉蒜等

又方 倚死竹色黑者取之折斷燒為灰篩和薄飲服之方寸匕忌牛肉餘無所忌 出第三卷中

古今錄驗療痔黃耆丸方 是直中書散時 黃耆 青箱子 漏蘆 鼈甲 炙狼牙 各五 黃柏 各四 犀角 各四 斑蝥 各四 蛭皮 各四 白礬 各十分 燒 芫青 各去足 地膽 各去足 蜈蚣 各十枚 猪鬃 各十枚 右十四味搗

篩為散蜜和丸如梧子大空腹以飲服二九日二增之以知為度忌一切油膩菹菜

又方 掘地深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去火以魚薄著口上取鳧宕子一合內坑中燒烟出痔入坐

上以被擁當汗出蜜室內作之以烟盡更著一合鳧宕子熏避風如發汗法則差

又療諸痔及下血不止轉虛羸者服之無不效方 黃耆 枳實 各二大兩半 黃礬石 一大兩炭大燒經

伏時仍數翻騰



下有原州  
着三字  
實下有南  
州者三字

尚德按有  
異疑當作

尚德按  
中下疑脫  
字

金句著火冷洗

右三味先搗黃耆枳實歸芪然後和礬石更搗勻蜜和九空腹以酒下二十九加至

又療痔方

鯉魚腸柯半

右一味擇之令淨仍新鮮取一方板可闊一尺以來厚二寸當中鑿孔深一

寸半圓如醬盞口大布魚腸于其內以好麝香碎末滲魚腸取厚毡二三重當心開孔可板孔大小鋪

坐以被擁之數進食可至兩炊久覺下部痛者即是蟲出也時且更坐良久取魚腸細擇之恐蟲入於

腸中蟲可長一二寸許細如網絲班作五色每出不過十餘枚不問度數蟲盡則止

許仁則曰此病有內痔有外痔內但便即有血外有異外痔下部有孔每出血從孔中出內痔每便即有

血下血甚者下血擊地成孔出血過多身體無復血色有痛者有不痛者有此候者宜依後藥方 生槐

子堅一斗破末 右一味搗令碎絞取汁日暴取稠取地膽暴乾搗篩為散和槐子煎作丸以飲服十九

日再加至三十九如桐子大兼以煎然作丸如棗核大內下部中日夜三四度亦可搗苦參末代地膽

此下宋本有一方地膽作地膽草  
藥中無地膽惟有地參十七字

依前生槐子煎不覺可宜合後黃耆十味散服之方 黃耆五兩 苦參 玄參各六兩 附子炮大黃各三兩 乾薑

二蠟皮炙二兩 黃連各四兩 槐子合六兩 懸蹄甲一具

右藥搗篩為散空腹以飲服方寸匕日再服之漸漸

加至二匕忌豬肉冷水卷中

痔下部如蟲齧方九首

肘後療痔下部痒痛如蟲齧方

胡粉 水銀 右二味以棗膏調勻綿裹夜臥內穀中導之效崔氏

又方 以皂絲子熟令黃黑末以雞子黃和塗之

集驗文仲備急  
范汪崔氏等同

又方 以杏仁熬令黑搗取膏塗之

崔氏備急  
崔氏同

又方 以蠟皮燒灰敷之又獺肝燒搗散服之

崔氏備急  
崔氏同

又方 以溺溫令熱內少礬石以洗之良

崔氏同並出  
第二卷中



文仲療痔下部如蟲齧方 搗桃葉一斛蒸之令熟內小口器中以布蓋上坐之蟲死即差附後崔氏備急同方有

梅烏

又方 掘地作小坑燒令赤以酒沃中搗吳茱萸三升內中及熱以板覆上開一小孔以下部坐上冷乃

下不過三度即差附後崔氏備急同

又方 以小豆一升好苦酒五升煮豆令熟出暴乾復內令酒盡止搗末以酒服方寸匕日三崔氏備急同

又方 以猪椒子一升酒一升經五日稍稍飲一日令盡佳崔氏同出第六卷中

大便下血風冷積年變作痔方三首

崔氏療大便急去血或至一升數合面少血色此是內傷風冷積年多變作痔方 大黃五分甘遂三分黃芩

分乾薑 附子各四 桃仁三枚去皮尖葱白七 右七味以水六升煮取一升半先服半升藥稍安又服半

升須臾血發又服半升未斷候發日再作不過三劑差忌猪肉等

又方 煮桃皮李皮篇蓄苦參取汁漬之大佳出第四卷中

備急療大便血風冷積年多變作痔方 燒稻藁皮淋汁煎熱漬之三五度佳 崔氏附後文仲同

灸痔法方二首

崔氏灸痔法 以繩圍病者項令兩頭相柱展繩從大椎正中量之垂繩一頭當脊正下以墨點訖又量

病者口兩吻頭接繩頭正下復點之又量病者口吻如前便中屈繩接前口吻繩頭正下復點之望使

相當所三處並下火重者各五百壯輕者三百壯即愈

又法 令疾者平坐解衣以繩當脊大椎骨中向下量至尾椎骨尖頭訖再折繩更從尾椎尖頭向上量

當繩頭正下即點之高饒州初灸至一百壯得差後三年復發又灸之便斷兼療腰脚並出第四卷中

雜療痔方五首

廣濟療痔瘻疽瘡方 光明砂別研麝香當門子別蛇皮五月五日者熱 右三味等分研先以鹽湯洗拭乾於瘡

尚德樓方  
字類行



上敷少蜜以散敷上差止

小品療道中痔瘡痔瘡槐皮膏方

槐皮五甘草

當歸

白芷各二

陳致

桃仁各五十

赤小豆各

右七味剉以猪脂二升煎候白芷黃膏成去滓以蜜之日三度

同集驗

刺繁療虛勞寒下痢不止肛邊轉生肉如鼠乳在大孔傍時時膿出名壯痔鑿甲丸方

鑿甲炙乾地黄

附子

槐子

礬石燒汁盡

黃連

連翹各七枯薑

黃耆

乾薑各六蟪螬各五

獨皮炙續斷各五

附子

槐子

礬石燒汁盡

右十三味搗篩以蜜大如梧桐大飲下二十九漸加至三十九日再忌如常

又療腎勞虛或酒醉當風所損腎藏病所為酒痔肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏方

蜂房三兩生槐白皮十練實

桃仁各五十白芷二赤小豆一

碎

猪膏一升

右七味咬咀綿裹以苦酒

一升漬一宿下膏煎取酒盡膏成去滓取杏子大餅裹內肛門中又酒服一方寸匕

出第三

必效療痔及諸蟲方

石留東引根一握

右一味勿令見風拭去土挫又取鹿脯四指大一片炙兩

畔令熟搗碎

以水三升煮取一升適寒溫空腹頓服之其患痔盛發者服即定諸蟲無問赤白並出

差

出第三

脫肛方三首

病源脫肛者肛門脫出也多因久痢後大腸虛冷所為肛門為大腸之候大腸虛而傷於寒痢而用氣暖

而氣下衝則肛門脫出因謂脫肛也

出第十

小品療脫肛重方

以女萎一升以器中燒生上重肛門即愈

范汪集驗十金

刪繁論曰肛者主大便通肺大腸合也號為通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸二分應十二時若

藏傷熱即肛開塞大便不通或腫縮入生瘡若肺傷寒則肛寒大便洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之

寒則補之不虛不實依經調之

療肛門主肺熱肛門閉塞大便不通腫縮白蜜兌通之方

以白蜜三升煎令成乾燥投冷水中可得

小



尚德按千金一日服十服勿散

重作慎舉

尚德按千金云溫清

酒一升服方寸匕半

日再若不

能酒與青

白米飲亦

得

尚德按千金宜用散

麻藤底立

灸乾文則

有單斑故

麻藤底就

法外臺合

為一方

尚德按千金生括莖

根為粉以

豬脂膏溫

九長六七寸許脫肛門中到身中向上入頭向下停少時免炸斯須即通泄

千金瘻肛出方磁石四兩桂心一兩皮一握右三味飾為散服方寸匕一日服十服即縮勿舉重須

斷房室周年乃佳千金有及急者衣四字宋本同

肛門凸出方三首

刪繁瘻肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉凸出猪肝散方猪肝一斤炙黃連阿膠炙芍藥各二烏梅

肉五兩艾葉一兩右六味搗篩平旦空腹服方寸匕日再若不

千金肛門凸出壁土散方故屋東壁土一升其頭出處取皂莢炙煨更選熨之取入則止

又麻藤底按入方麻藤底盤頭收右二味燒盤頭為散敷肛門凸出頭炙履底以按熨令入永不

出矣並出第二十五卷中

卒大便脫肛方六首

肘後療卒大便脫肛方灸頂上迴髮中百壯

又方以豆醬清合酒塗之文仲備急同

又方燒虎骨末水服方寸匕日三即差

范汪療卒大便脫肛方以絞桑枝螺取燒末猪脂和敷之立縮亦可末以粉之備急張文仲同第三卷中

千金療卒大便脫肛方以猪膏和蒲黃敷之指推內之但以粉粉之亦佳張文仲備急同

又方灸鵝尾骨上七壯備急文仲同第二十五卷中

腸肛俱出方二首

肘後療若腸隨肛出轉廣不可入一尺來者方鵝生枯蕒取汁溫服之以猪肉汁洗手隨抑按自得入

效范汪小品張文仲備急千金同

卒大便脫肛方六首

五



尚德按  
金灸法別  
為一方

九字下  
本有忌  
生葱大  
粘食等  
十字

尚德腰千  
金與此方  
中財後  
尚德腰千  
金壯片皮  
海藥細干  
各一兩有  
防風二兩  
為十六末  
加至三十  
九  
尚德按出  
字下疑脫

脫肛歷年不愈方三首

集驗癰腫肛歷年不愈者以生跌三斤以水一斗煮取五升以洗之日再洗

千金療脫肛歷年不愈方 以死鼈頭一枚燒令烟盡作屑以敷肛門上手按之令人兼灸橫骨一百壯

又方 以鉄精粉上按令入即愈 並出第二十五卷中

疝氣及癰方六首

廣濟療疔氣核腫疼方  
黃耆 桃仁<sub>去尖</sub> 山茱萸 五加皮 檳榔仁<sub>各八分</sub> 牛膝 茯苓<sub>各六分</sub> 茯苓<sub>八分</sub>

五味子分十八人參續斷各六分桂心分八遠志分五石南分五海藻洗八分芫蓂分十枳實分八龍骨分八蒺藜子

右十九味搗篩蜜丸如桐子大酒服三十丸日二漸加至四十丸

又療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊腫痒狐陰丸方  
狐陰一錢 木香 疾藜子 脛肭臍 昆布各六分 牛腰

菟絲子各八分 酒漬 桃仁去尖 石斛各十 橫櫚仁投 石十味 搗篩蜜和丸 如梧子大 空腹以酒下二十丸

至二十九日再服忌熱麵麥豬肉粘食等物

取楊柳如脚大指長三尺二十枚以水煮令極熟以故布乾掩腫處取柳枝更互挂之如

此取差正文仲滿急千金同

千金瘡藥方 中丹 海帶二斤洗 徐陰灸 地膚子 茯苓 五味子 芍藥 橘皮各二兩 蜘蛛五十個 防

桑 紐子 蕤子 桂心 澤瀉  
各二兩 桃仁五兩 桂去皮尖  
 右十五味下篩蜜和服十九如梧子大稍

加至二十九日。生薑。生米。酢物。出藥中

補色類方  
補仁推敷之可療婦人陰腫乾即易第五卷中

古金銀藥丸 乾地黃 鹿茸 十分紅銀 砂礞石 礞石 十分紅銀 桂心 續命

巴戟天 陽明 空夢 蓮草 升麻 牛膝 寄生 淫瀝 分 射干 分 從容 分 海藻 如煆

外臺秘要  
卷三十六

將此藥平不食者三日  
症愈及服六日

六

六



藏書印

又解人上八脈方



又男陰卵偏大癩法 灸肩井解臂接處隨年壯男癩灸小指端七壯病在左者灸左在右者灸右良效  
又法 灸關元百壯

又法 灸玉泉百壯報之穴在臍下四寸

又法 灸泉陰百壯三報之在橫骨邊三寸

又癩病陰卒腫者法 令並足合兩拇指爪相並以一艾丸灸兩爪端方角處一丸令頭上兩爪角各令

半丸上爪上七壯

又兩丸縮入腹法 灸三陰交隨年壯神效

又男陰卵大癩病法 灸足太陽五十壯三報之

又法 灸足太陰五十壯又在內踝上一穴

又法 灸大拇指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗雙灸之

又法 灸橫骨兩邊二十壯夾莖是也

又法 灸足大指理中十壯隨邊腫灸之

灸小兒癩法 先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一灸訖便牽小兒令碓

頭下向背囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷帽將頭大耳

又法 凡男癩當臍碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯即愈並出第二十五卷中

陰腫方六首

病源此由風熱客於腎經腎經流於陰腎不能宣散故致腫也出第四卷中

集驗療男子陰腫大如斗核痛人所不能療者方 以雄黃一兩研碎綿裹甘草一尺生用切水一斗者

取二升以洗之忌海藻菘菜商德按千金有礬石二兩

又方 取莧菜根搗薄之金同

藥字下米  
本有千金  
有礬石二  
兩文仲用  
礬石十二  
小字

十米本作  
下同  
商德按  
千金作  
下同



又方 取蔓菁根薄之范注同並出

又方 痔馬鞭草薄之第九卷中

文仲療陰腫方 取姚仁去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即差千金備急同

古令錄驗瘰癧大如斗方 取雄翅虎灰飲服其毛一孔生兩毛者佳腫在左取左翅在右取右翅雙腫

取兩邊翅千金治小兒鉅腫

陰疽腫痛方一首

病源疽者氣痛也眾筋會於陰氣邪客於厥陰少陽之經與冷氣氣相搏則陰痛而攣縮也出第四

文仲療陰卒縮入腹急痛欲死名陰疽方 狼毒四兩防葵兩附子二兩 右三味搗篩蜜和丸如梧子

酒服三九日三夜二古今錄驗范注

陰卒腫痛方三首

文仲葛氏療男子陰卒腫痛方 灸足大指第二節下橫理文正中央五壯姚云足大指本三柱亦治小

灸之出第七卷中

備急療男子陰卒腫痛方 雞卵六枚蛇床等 右二味為末以飲服少許隨卵左右取雞羽集驗同姚

又若有息肉突出方 以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗一日夜三四度差肘後同出

陰囊腫痛方五首

千金有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜即痛悶不得眠睡方 取生椒擇之令淨以布綿裹著丸

囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消為效乃止

又方 煮大前根汁服一升日三不過三劑愈

又方 醋和麵灸令熱熨之

又方 以醋和麵灸之

尚德按皮  
即痛悶十  
金作日夜  
寒則

尚德按湯  
病深作瘰  
末本二字  
下有忌端  
肉冷水五  
字中字下  
有肘股用  
防風不用  
字

尚能按湯  
鍼灸石病  
源作湯灸  
針石送本  
同但到作  
鍼

皮字下宋  
本有若字  
機字下宋  
本有奇義  
二字

又方 釜月下土以雞子白和敷之效 肘後並出第  
二十五卷中

陰下瘰癧方七有

病源大虛勞損腎氣不足故陰汗陰冷液自泄風邪乘之則瘰癧也其湯鍼灸石別有正方補養宣導今

附於後養生方導引法云臥令兩手布膝頭取踵置尻下以口內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕

少腹裏痛膝冷不隨 出第四  
卷中

文仲瘰癧瘰癧生瘡方 嚼胡麻塗之驗 肘後十  
金同

葛氏瘰癧囊下濕瘰癧皮剝方 烏梅 十四錢四十  
文同 鹽 三指 右三味以苦酒一升於銅器中浸九日洗之

效同

又方 煮槐皮苦參黃柏及香蒿汁洗之並良 肘後同出  
第七卷中

救急瘰癧陰下濕瘰癧成瘡方 縮蹄兩槐白皮 切一  
升 左二味斟酌以水煮洗瘡一日五六過水差

又方 煮桃皮和黍米汁洗之 並出第  
五卷中

古今錄驗瘰癧陰下瘰癧湯洗方 甘草一尺以水五升煮取三升漬洗之日三四度便愈 出第四  
一卷中

又瘰癧陰下濕瘰癧生瘡方 吳茱萸一升水三升煮取三五沸去滓以洗瘡瘰癧亦治之 出第四  
一卷中

陰痛方三首

病源腎氣虛損為風邪所侵邪氣流入於腎經與陰氣相擊真邪交爭故令陰痛但冷者唯痛挾執者則

腫其腸熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩足指向下挂席兩涌泉相拓坐兩足

跟頭兩膝頭外叉手互前向下盡勢七通去勞損陰膝冷 卷第四  
中

集驗瘰癧陰痛如刺汗如雨出方 小蒜 一斤 韭根 一斤 楊柳根 一斤 右三味合燒以酒灌之及熱氣熏

之即愈 千金同出  
第九卷中

千金瘰癧陰腫痛方 灸大敦三壯



又方 車前子末酒服之佳 出第二十卷中

陰瘡方七首

病源腎榮於陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則為風邪所乘邪容腠理而正氣不泄邪正相干在於皮膚故瘡搔之則生瘡 出第四卷中

千金療陰下生瘡洗湯方 地榆 黃柏 略八 右二味以切水一斗煮取六升去滓適寒溫洗瘡日再

只以黃柏湯洗亦效

又凡妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似瘡瘡作白方 用銀釵以綿裹用臘月豬脂重黃

火上煖以釵烙瘡上令熱取乾槐枝熟塗之以麝香黃礬青礬末敷之小便後即敷之不過三兩度差

但用瘡瘡方中藥敷之即差 出第二十五卷中又槐枝十金作枝末本

葛氏療男子陰瘡方 爛煮黃柏洗之又用白蜜塗之

又方 黃連黃柏各等分末之先煮肥猪肉湯洗之然後以藥粉之

又方 以蜜煎甘草末塗之太良比見有人患塗頭腫坎下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用前粉粉之

及依陶方即差神驗 出第七卷中

必效療陰生瘡膿出作白方 高昌白礬 兩一 右一味搗細研之鍊猪脂一合於磁器中和攪作膏取槐

白皮切作湯洗瘡上拭令乾即取膏敷上及以楸葉貼上不過三兩度永差

古今錄驗瘡陰瘡方 黃柏 黃連 各三 胡粉 合 右三味搗為末粉上日三婦人綿裹棗核大內之 出

卷中

陰邊粟瘡方五首

必效療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕瘡方 以槐北面不見日處白皮一大握鹽三指一撮以水二大升

煮取一升洗之日三五過適寒溫用若涉遠恐衝風即以米粉和塗之神效

尚德按千金以水一斗五升者  
尚德按白字下千金有齋食之大痛即不痛九字  
本同但白作時藥作創瘡作甘

尚德按時後作藥差字下宋本有時後有細麻等分同十小字

尚德按詞  
疑當作詞  
下並同

尚德按詞  
疑當作詞  
下並同

又療陰瘡有二種一者作白膿出名曰陰蝕瘡二者但赤作瘡名為熱瘡若是瘡用此方取黃柏黃芩各一兩切作湯洗之用黃柏黃連末粉之云神良

又方 以黃連和胡粉末敷之必效

又方 紫芽茶末一荷葉燒灰 右二味煮末以鹽糖水洗訖敷之三五度即愈

又方 取停水處乾卷地皮末敷之神效 是長安郭承恩用之獨效出第四卷中

著硯砂方四首

救急瀉逐着硃砂損陰方 猪蹄一具浮萍草三兩 右二味以水三大升煮取半升去滓以瓶子盛汁中

陰瓶中漬之冷即出拭乾便敷後藥粉之

又粉法 黃柏根皮 黃柏各二  
分 朴硝 蛇床子各  
一分 甘草  
二分 右五味搗為散用前法浸洗後以粉

瘡上亦不甚痛風寒中

必效主著硃砂方 取雞子一枚者熟剉取肉更用生雞子一個傾取白和熟研令細以綿裹之立定

奇州  
鼓云

又方 甘草 黃柏 白礬 汁盡 右三味為末 敷之 出第4卷中

九中芳一首

病源大九蟲者一曰伏蟲長四寸二曰蛔蟲長一尺三曰仁壽長一十四曰收蟲狀如爛杏五曰肝蟲

如蠱形六曰胃蠱狀如蝦蟇七曰癘蠱狀如疥癩八曰赤蠱狀如生肉九曰蜺蠱至細微開如茅蟲伏蟲

華蟲之主也。雖變質而殺人白蟲朴生子孫輒大長至四五尺亦能殺人。或蟲令人腹潰肺盡令人卒

救胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦又石脂蟲令人多唾赤蟲令人腹中蟬蟬居肌腸多食為痔瘡貝之者

因人瘡是以生瘡。州瘡瘡物瘡無所不為。人亦不必盡有。亦不必盡多。愈。倘有或偶無者。出第

蟲依腸胃上則名別肺癰即不為害若虛而能化則其蟲重而變成蟲達也十八卷中

[illegible]



生癰瘡丸主癰九蟲動作諸病方  
骨泉煮石蘇分五 狼牙分四 雅蘆二分 宋本 蜀漆六分 蠶絲三分

雷丸六分 蕪荑分四 厚朴分三 檳榔分六 右十味搗篩蜜丸空心煖漿水服三十丸日三不知稍稍加之白蟲

用櫃子湯服備文仲古今醫輿記注同出第九卷中

五臟蟲方七首

刪繁瘕脾勞有白蟲長一寸在脾為病令人好嘔而胸中咳嗽一作嘔而不吐出前胡湯方 前胡 白

木 赤茯苓各三 枳實各二 細辛各三 旋覆花各一 常山各三 松蘿各二 龍膽各三 竹葉各一 杏仁各三 兩去 右十

一味切以水一斗煮取三升去滓分三服若腹中熱滿下於脘三兩黃芩三兩苦參二兩加水二升依

方煎忌如常

又瘕脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔案黃根下蟲湯方 萊菔東引根大者一尺切 大麻子八 橘皮二

切 右三味切搗麻子爛並和煎服或下黃汁凡合藥禁聲勿語道作瘕蟲當開便不下切須忌之甚

驗以水煎服臨時量之效

又瘕肺勞熱獨生肺蟲形如蠶在肺為病令人欬逆氣喘或謂憂悲氣膈熱皆從勞之所生名曰膏育

鍼灸不著麥門冬五兩下氣丸方 麥門冬各十兩 蜀椒四分 遠志 附子炮裂乾薑五分 甘草十分 人參七分

細辛六分 桂心五分 百部根 白朮 黃耆各五 杏仁四十枚 橘榔五分 右十四味搗篩蜜丸如彈子許含一

丸稍嗽汁忌如常

千金瘕腎熱四肢腫急蟻蟲如菜中蟲生腎中為病方 黃耆大者三 乾姜二兩 萊菔六分 一云杏仁十

枚 蕪荑 胡粉 槐白皮各四 右七味搗散平旦以井花水服方寸匕增之以差止

又肺勞熱生蟲在肺為病方 東行桑根白皮切一升 東行萊菔根切五 狼牙三兩 右三味切以酒七升煮

取一升半平旦服盡

又瘕肝勞生長蟲在肝為病令人目眵不安眼中赤方 雞子五枚 東行萊菔根切三 蠶絲三 乾姜四 兩

如常宋本 作晚宋本 白大所生 蕪荑生 十一字 尚德按滿 疑當作晒 如常宋本 作猪肉 菜桃李生 肉等十 尚德按千 金五兩 五合與半 字 尚德按千 金三升 作

三兩半升  
作半升服

一百丸  
尚德按到

時益金條  
時益金條

作益  
又按千金

實錄三  
理錄三

按有石鑑  
五分英華

茂根成七  
分爲十二

味若酒下  
又九加至

二十九  
尚德按到

疑當作蟻  
疑當作蟻

尚德按種  
病源作腫  
源按實病  
本作青宋  
便宋本作  
並

尚德按口  
疑當作蟻

米粉并 右五味搗末黃根末為末和藥劉器中打雞子調火鍊可丸如小豆宿勿食且以從服一百

二十九小兒五十九蟲即爛出差

又療心勞熱傷心有長蟲名蛔蟲長一尺貫心為病方 雷丸蘇橘皮 桃仁各五狼牙各六貫眾各三黃蘗

青蘗子 乾漆無各亂髮如雞子燒蠶蠶二十枚 右十味搗篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服之

長蟲方二首

集驗療長蟲雞子丸方 雞子白三枚乾漆四兩黃臘二兩粳米粉并 右四味內銅器中於微火上煎蠶令

調內粉令凝可丸置土上溫乃內雞子攪令相得又煎令可丸宿勿食以飲下小豆許大一百二十九

小兒五十九效驗

又方 取棟實以瀉苦酒中漬再宿以絲裏內下部中令人三寸許一日易之千金苑汪同並出第九卷中尚德按千金治蛇蟲在

謂中人

蛔蟲方九首

病源蛔蟲者是丸蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因腑臟虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹

中痛發作種聚去來上下痛有休息亦攻心痛口中喜涎及吐清水責傷心者則死診其脈腹中痛其脈

法當沉弱弦令反洪而大則蛔蟲也出第八卷中

廣濟療蛔蟲方 酸石榴根東引八土五檳榔十枚 右二味以水七升煮取二升半絞去滓著少米煮

稀粥平旦空肚食之少間蟲便死快利效無忌出第四卷中

肘後療蛔蟲或攻心痛如刺口中吐清水方 取龍膽根多少任用以水煮濃汁去滓宿不食平旦服一

二升不過再服下蛔蟲也

又方 取有子棟木根剉以水煮取濃赤黑汁用米煮作糜宿勿食且取肥香脯一片先喫令蟲聞香舉



頭稍從一口為度始少進漸加服一匕服至半升便下蛔蟲千金文

又方 以雞子一枚開頭去黃以好漆少許內中相和仰頭吞之蟲悉出矣文仲集驗備急千金同出第二卷中

集驗蛔蟲攻心腹痛方 取薏苡根二斤剉以水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出千金范汪同出第九卷中

千金療蛇瘡方 蘆盧下篩以餅臠和服方寸匕蟲不覺出之亦主蛇蟲出時微云蘆盧一兩末以羊肉

崔氏療蛇蟲方 取蠛蠓蛹汁空腹飲之良若非綠絲時即須收蠛蠓暴乾患者搗篩取意斟酌多少和粥

飲服之

又方 蠛蠓三兩 右一味搗散以肥豬肉但得一色以蔥豉為臠汁每旦空腹服以臠汁和一方寸匕

頓服稍多飲臠汁佳若不能散服即以蜜和為丸如梧子一服十丸遂以此臠汁下之假令明旦服今

日暮即勿食明旦服藥訖遂至已時為佳要服此丸散使盡已後三十日勿雜食水差出第五卷中

必效療蛔蟲方 菴豆三升煮取濃汁麻子一大升研取汁一升以下然後取麻子汁半升和豆汁一升

更煖令溫溫正發即炙羊肉臠令熟先含蠛汁三五嚥即服之須臾即吐出或利其蟲已消如綿練帶

三二百條如末盡更服即水絕郭參軍云蠛蠓無不差者一方服麻子汁數出第六卷中

### 寸白蟲方一十九首

病源寸白者九蟲之一也長一寸而色白形小扁因臍臟虛弱而能發動或云飲白酒以桑枝貫牛肉炙

食之并食生魚所成又食生魚後即飲乳酪亦令生之其發動則損人精氣腰脚疲弱又云此蟲生長一

尺則殺人出第十卷中

廣濟療白蟲如馬蘭葉大於下部出不盡以刀截斷者令人漸漸羸瘦石榴湯方 醋石榴根東引者無

美三兩 蠶牛子半兩 右三味以水六升煮取二升去滓分三服別和牽牛子末每服如人行五里更服

盡快利蟲亦盡死出忌生冷鱸魚牛肉白酒葵等此方神驗

又方 狼牙 白欬各四 魚美六 右三味搗散空肚以大醋和如膏溫頓服之無所忌千金同出第四卷中

通按牙子  
即狼牙

棟宋本作  
橋

尚德按  
疑當作蒼

又按  
當作餘

又按  
當作餘

尚德按  
然類作

肘後療白蟲方 瀉漆 猪血各三 右二味相和微火上煎之不著手成宿勿食空腹旦先吃肥香脯

一片服如大豆許百一丸日中蟲悉出亦主蛇蟲

范汪

又方 濃煮猪肉汁煎檳榔三十枚取三升服之蟲盡出

文仲備急

又方 熟煮猪脂血宿勿食明旦飽食之蟲當下

文仲備急

范汪療白蟲橘皮丸方 橘皮加牙子 蕪荑各六 右三味搗篩蜜丸如梧子以漿水下三十九丸先食

日再服

又方 狼牙兩 右一味搗篩蜜丸如麻子大宿不食明旦空腹以漿水下一合服盡差

又方 棟實破其上取皮中子搗合蜜丸如梧子宿不食旦以醋漿水若米汁下三百丸蟲並死或以糜

爛皮亦可丸服八十九丸忘如常法

出第十卷中

備急療白蟲蕪荑散方 狼牙三分 蕪荑二分 右二味搗為末酒和服之先食脯後頓服盡立差

張文仲

六卷

救急療白蟲方 石榴枝東引者一檳榔也 右二味以水二大升煮取強半頓服欲服時先嚼鹿脯嚥

汁即進之每月一二三日喫藥必差以蟲頭向上月三以後服藥不效為其蟲頭向下也今日欲服預

前一日莫食其蟲吃藥之後或利出或內消皆差忘食生繪白酒諸生肉冷物一月餘

又方 取榧子一百枚去皮大然咬之能食盡佳不能者但啖五十枚亦得經宿蟲消自下無忌

崔氏同

中卷

崔氏療白蟲諸方不差方 取石榴東引根令患人以手大指與第三指滿一握兩頭出者總留之又取

乾脯肥者手大一片細剉以水四升漬之一宿明旦煮取一升去滓分三服如人行十里久每欲服先

嚼脯一片然後飲藥并令人以手按所患人腹令藥易宣都服了有頃當自便蟲出服藥以月一至五

日以前是蟲頭向上服之得力無問多少得得出盡若疑蟲未盡更合一劑永愈



致字下家

本有不用

尚按接九

千金作九

宋本同

尚按接九

千金作九

尚按接九

金錫作錫

連作十分

尚按接出

字下疑脫

第字下家

本有各三

分三字

數字下家

本有本字

又方 東引藥更根以麻子作大 右二味先搗麻子極碎又盆中熟研以水一大升更和研絞取濃

汁以浸菜更根一宿明旦煮兩三沸頓服如不頓服分再服至明旦欲服藥今日午後便不得食仍須

先嚼一片肥乾脯嚼汁然後服藥服一劑去蟲不盡停一日更作服一劑永差後一月日勿食脂膩魚

肉必效出第五卷中

千金療白蟲方 取樞子四十丸枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日服盡蟲消為水永差

又方 取菜更根北陰根洗去土切以酒一升漬一宿平旦去滓分再服凡菜更皆用細根東北陰者良若

指以上大者皆不佳用之無力說注

又方 取錫令連燥末平旦作羊肉臠以藥方寸匕內汁中服之一方熱胡粉

又方 桑白皮切三升以水七升煮取二升宿不食明旦頓服之

又方 用石榴根如菜更根法

又方 胡麻并胡粉兩一 右二味搗末明旦空腹以猪肉臠汁服盡即差並出第十卷中

蛇蟲方六首

病源蛇蟲是九蟲之一也形甚小如今之蝸蟲狀亦因臍臟虛弱而致發動甚者則能成痔瘻疥癬癰

疽疔諸瘡蛇蟲此是人體虛弱極重者故蛇蟲因之動作無所不為也出十八卷中

范汪療蛇蟲花散方 芫花 狼牙 雷丸 桃仁去皮 右四味搗散宿勿食平旦以飲服方寸匕

當下蟲也

又巴豆白膏療蛇蟲方 巴豆一枚燒令明 桃仁四枚熱令 右二味合搗作三九大人清旦未食以漿

服盡少小服一九若不下明旦更復作服並出第十卷中

千金療蛇蟲在胃中漸漸羸人方 滴酒 白蜜 好漆各一 右三味合銅器中微火上煎之令可丸

丸如桃核大一枚宿勿食空腹溫酒下急不下再服之財後備急集驗范注

丸如桃核大一枚宿勿食空腹溫酒下急不下再服之財後備急集驗范注

丸如桃核大一枚宿勿食空腹溫酒下急不下再服之財後備急集驗范注

備急葛氏療蟻攻心如刺吐清汁方 搗生艾汁宿不食平旦嚼脯 片令蟲聞香後飲汁一升當下

蟻備急艾汁並同 蟻針微云瘡蛇蟲

陶氏療蟲方 取七月七日疾藜子陰乾燒作灰先食服方寸匕一服三日止范汪千金同

又方 以好鹽末二兩滴酒半升於銅器中煮令數沸宿勿食清旦溫空肚頓服之備急艾汁并千金范汪等同並出第七卷中

三蟲方七首

病源三蟲者長蟲赤蟲蟻蟲為三蟲也猶是九蟲之數也長蟲者蛇蟲也長一尺動則吐清水出則心痛

貫心則死赤蟲狀如生肉動則腸鳴蟻蟲細微形如菜蟲也居腸胃之間多則為痔刺則為癰因入瘡處

即生諸癰疽癰癰瘡齕蟲無所不為此既是九蟲內之三者而今別立名者當以其三種偏發動成病

故謂三蟲也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以兩手著頭相叉長引氣即

吐之坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中疾低頭入兩膝間兩手交叉頭上十二通愈三蟲又云叩齒二

七過輒咽氣二七如是三百通乃止為之二十日邪氣悉去六十日小病愈百日大病除三蟲伏尸皆去

面體光澤出第十卷中

肘後療三蟲方 萊菔根取東引指大枯薑切四兩 右二味細剉萊菔根以酒一升漬之一縮旦絞去滓

宿勿食旦空腹先吃脯然後頓服之小兒分三服亦療寸白蟲

又方 搗桃葉絞取汁飲一升千金集驗同 又方 真珠研兩亂髮如雞子大燒末 右二味內苦酒中旦空腹頓服之令盡集驗范汪同

又三蟲者謂長蟲赤蟲蟻蟲也乃有九種而蟻蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一

尺則殺人服藥下之須結裏消然出盡乃佳若斷者相生未已更宜連從之蟻蟲多是小兒患之大人亦

有其病令人心痛清朝口吐汁煩燥則是也其餘各種種不利人人胃中無不有者宜服九蟲丸以除之

范汪療三蟲白飲丸方 白飲 狼牙 蘆蘆 桃花 貫衆 橘皮 分二 蕪荑 分一 右七味搗篩蜜丸

外臺秘要 卷二十六 三蟲方七首 雜療蟲方三首



如小豆大宿勿食旦以漿水服一劑日中乃食立下男子病大腹面黃欲食肉服此藥下赤蟲如笋莖者一尺所有頭目百餘枚病愈又九江謝丘病脇下有積大如杯小腹亦堅伏痛上下移嘔逆喜唾心下常痛欲食肉服此藥下蟲無頭足赤身有口尾二百餘枚得愈又九江陳昉病大腹煩滿常欲食生菜服此藥下白蟲大如臂小者百餘枚立差妊身婦人不得服之

又療三蟲竹節丸方 燒竹節 雷丸<sup>銘</sup> 錫屑<sup>仁橘皮</sup> 一分 右四味搗篩蜜丸如梧子大一服八九日三服

又療三蟲芩藟散方 芩藟 雷丸 桔梗 白芷<sup>銘</sup> 右四味搗散以蜜飲苦酒或米汁服方寸匕

日三服又可用蜜丸如梧子吞十三丸當稍稍下不盡更服一劑<sup>出第十卷中</sup> 備急瘳三蟲方 霍亂<sup>四兩</sup> 乾漆<sup>二兩</sup> 吳茱萸<sup>四兩</sup> 右三味為末依前法嚙脯以粥清服方寸匕日一服

<sup>吐衄</sup> 吐衄

### 雞瘳蟲方三首

廣濟瘳蛔蟲寸白蟲方 檳榔<sup>針</sup> 二當歸 鶴蟲 蕪荑<sup>各六分</sup> 橘皮<sup>各六分</sup> 貫眾 雷丸<sup>各四分</sup> 右七味搗散

空腹煮大棗湯服方寸匕日二服漸加至三七微利無忌<sup>出第四卷中</sup>

千金瘳燒蟲蛔蟲及痔匿蟲食下部生瘡桃湯方 桃皮<sup>兩</sup> 槐子<sup>兩</sup> 艾葉<sup>一兩</sup> 大棗<sup>三十枚</sup> 右四味以水三

升煮取半升空腹頓服之<sup>出第八卷中</sup>

瘳寸白蟲化為水泄出未除方 檳子 檳榔 蕪荑<sup>各</sup> 三味為散溫酒服二錢匕先燒牛肉脯吃後

服藥

唐王素先生外臺秘要方卷二十七目錄淋并大小便難

諸淋方三十五首

石淋方一十六首

小便赤色如紅方三首

勞淋方三首

膏淋方二首

大便難方六首

大便閉澀不通方七首

關格脹滿不通方四首

小便不通方一十二首

遺尿方六首

胞轉方一十五首

小便不禁方二首

許仁則小便數多方四首

灸穴雜法一十二首

淋并大小便難

五淋方三首

血淋方五首

熱淋方三首

氣淋方五首

許仁則淋方二首

大便不通方一十七首

大便失禁并關格大小便不通方二十二首

許仁則大便暴閉不通方三首

小便難及不利方九首

尿血方一十一首

小便血及九竅出血方一十二首

小便數及多方五首

尿淋方六首

尚按發開  
疑當作坎  
尚按發三  
疑當作二  
尚按發二  
疑當作三

尚按發令  
有方一首





唐王壽先生外臺秘要方卷二十七

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

諸淋方三十五首

病源諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎為表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰為洩便也腎氣通於陰陰津液下流之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則膀胱不和致腎氣虛而膀胱熱也膀胱津液之腑熱則津液內溢而流於畢水道不通水不上不下停積於胞腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀則淋瀝不宣故謂之淋其狀小便出少起數少腹弦急痛引於臍又有石淋勞淋血淋氣淋膏淋諸淋形證各隨名具說於後章而以一方療之者故謂諸淋也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃臥令兩足布膝頭斜踵置鳩口內氣振腹鼻出氣去淋數小便又去石淋莖中痛又云踞踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足跌上急手握足五指極力一通令內曲以利腰龍療淋也

出第十卷中

廣濟療患淋來積年比醫療不能得愈或十日五日一發即有可時今年因病更頻數二十日來不定方

滑石 冬葵子各八分 瞿麥 石葦各五分 蒲黃六分 陳橘皮四分 藥 茯苓 芒硝各六分 子芩六分 右十

味禱歸為散空腹煮後飲子服方寸匕日二服漸加至一匕半忌熱麵炙肉醋蒜等

又飲子方 桑白皮六分 通草 百合各八分 白茅根一分 右四味細剉以水四升煮取二升去滓溫下煎散

藥口乾渴含之亦得也

又療淋小便不通六七日方 滑石五兩 通草三兩 瞿麥二兩 冬葵子一兩 茅根升 石葦三兩 芒硝二兩 右七味切

以水九升煮取二升八合去滓內芒硝分溫三服每服如人行六七里進一服以微利為度忌如前

愈來本作  
數字下本  
本有今字  
半字下本  
本有不利  
二字  
一分來本  
者十分新

第四卷中



范汪療淋方 取紫纒草滿兩手把以水煮服之可常作飲勿不飲也

又方 煮兔絲子服之如紫纒法

又方 露蜂房燒破服之取如碗大者妙

又方 雞子二枚去白黃以鹽內殼中使滿以三升水漬一升豉絞取汁取殼中鹽投汁中攪令調盡服

又方 滑石 海蛤 雞子壳各等 右三味搗篩為散以飲服半錢匕日三服漸加至一錢匕甚良

又方 取地麥草一名地膚草二七把以水二升煎之亦可長服一法旦漬豉汁飲之良

又療淋利小便葵子散方 葵子半升滑石二石南葉一兩地榆三兩石葦一兩通草一兩 右六味搗篩為散飲

服方寸匕日三服良

又療淋莖中有石方 取雞屎白半升暴乾熬之令香搗篩為散以酪一云漿飲方寸匕日三服到一二

日當下石即愈

又療淋師所不能療者神方 取葛上亭長生折斷腹中有白子如小米長二三分取著白板上陰

乾燥二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小盆中水如裏許內藥

盞中半食頃以爪甲研當令扁扁見於水中仰頭令人為入咽喉中勿令近牙近則著牙齒間不盡得

入咽之也藥雖微小下喉自當覺至下焦淋所有項藥作大煩急不可堪者飲麥乾飯汁藥勢止也若

無麥乾飯汁但水亦可耳老小服三分之一藥當下淋如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黃男

女服之皆愈并瘡婦人產後生餘疾積聚或成帶下服之亦愈此蟲正月二月為光青三月為王不留

行四月五月六月為葛上亭長七月為班貓九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若淋不

止以意歸度更增服之

並出第六十五卷中

小品地膚湯療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或便血溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及步行冒熱冷飲逐熱結下焦及孔石熱動關格少腹堅胞脹如斗大諸淋服之即通方地

便宋本作行

尚德樓書

書食寶

江用藥氏

舊錢經重

報打大者

謂之北輪

中者謂之

四大

良字下

本有忌

桃李在肉

等七字

服字下

本有忌

肉桃李

物等八

膚草<sup>三知母</sup> 猪苓<sup>去瞿麥</sup> 黃芩 升麻 通草<sup>各二</sup> 海藻<sup>一</sup> 葵子<sup>升</sup> 枳實<sup>二兩</sup> 右十味切以水九升煮取三升分爲三服大小便皆明者加大黃三兩婦人房勞腎中有熱小便難不利腹滿痛脈沉細者加豬腎一具<sup>水一斗半煮取一斗內豬腎先以</sup>

又療淋榆皮湯方 榆皮<sup>半斤</sup> 滑石<sup>二兩</sup> 黃芩<sup>一兩</sup> 甘草<sup>二兩</sup> 瞿麥<sup>各二</sup> 葵子<sup>升</sup> 右六味切以水一斗煮取三升溫服一升旦服忘海藻<sup>松菜</sup> <sup>並出中</sup>

集驗療淋方 以比輪錢三百文以水一斗煮取三升飲之神效<sup>肝後同千金治氣淋通淋此輪錢未詳之字下宋本有千金不偶四字</sup>

又方 取牛耳中毛燒灰服半錢已立愈<sup>仲文</sup>

又方 燒頭髮灰服之良<sup>文仲同並出第五卷中</sup> 滑石<sup>四兩</sup> 貝子<sup>三十枚</sup> 茯苓 白朮 通草 芍藥<sup>各二</sup> 右六味千金療淋痛方<sup>高麗按三十枚千金作</sup>

博師為散酒服方寸匕日三服大良

又方 葵子<sup>五</sup> 茯苓 白朮 當歸<sup>各二</sup> 右四味切以水七升煮取三升分三服<sup>范注</sup>

又方 枯薑 滑石 石葦<sup>去皮各二兩</sup> 右三味為散以大麥粥飲服方寸匕日三服良

又方 蜀葵根<sup>兩大麻根五兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 貝子<sup>五</sup> 通草<sup>二</sup> 茅根<sup>三斤</sup> 石首魚頭<sup>石四兩</sup> 右七味切以水一斗二升煮取五升分爲五服日三夜二服亦主石淋

又方 取細白沙三升一味熬令極熟以酒三升淋取汁一合服之<sup>補服</sup>

又方 榆皮<sup>斤</sup> 車前子<sup>升</sup> 冬瓜子<sup>升</sup> 鯉魚齒 桃膠 地麥草 通草<sup>各二</sup> 瞿麥<sup>四兩</sup> 右八味切以水一斗煮取三升分三服日三服

又療卒淋方 灸外踝尖七壯

又方 取石首魚頭石末水服方寸匕日三服<sup>並出第二</sup>

又方 鯉魚齒燒灰末酒服方寸匕日三服<sup>十一卷中</sup>

各味方一



崔氏療淋散方 石葦去毛 大蟲研 滑石一兩 當歸 芍藥 黃芩 冬葵子 瞿麥各一兩 亂髮三

如雞子茯苓一兩 右十味搗篩為散服方寸匕日二服出第四卷中 通接

古今錄驗療淋瞿麥散方主淋 瞿麥 石葦去毛 滑石 卓前子 葵子各四兩 右五味搗篩冷水服

方寸匕日三服增至三匕

又方 取生續斷絞汁一升服之

又療淋滑石湯方 滑石一兩 榆白皮二兩 石葦去毛 地麥草 葵子各二兩 右五味切以水一斗煮取四升

分四服日再服甚良

又療淋榆皮湯方 瞿麥二兩 防葵 榆白皮各一兩 葵子一兩 滑石二兩 甘草二兩 黃芩一兩 右

七味切以水一斗煮取三升分二服

又方 取附船底皂大如鴨子以甌半水煎取一甌頓服日三服千金治氣淋並出第二十六卷中

近效療淋方 葵子一升 右一味以水三升煮取二升去滓分溫服前藥根飲

又方 人參六分 厚朴三分 粟米二合 右三味切以水三升煮取七合以新布絞去滓分溫三服服別相

去如人行七里

又方 茯苓 地骨皮各三兩 甘草 黃芩 前胡 生薑各二兩 麥門冬八兩 竹葉切 蒲黃二兩 右九味

切以水九升煮二升六合去滓分為三服

五淋方三首

集驗論五淋者石淋氣淋膏淋勞淋也石淋之為病小便莖中痛尿不得卒出時自出痛引少腹膀胱裏急氣淋之為病小便難常有餘瀝膏淋之為病尿似膏白出少腹膀胱裏急勞淋之為病倦即發痛引氣衝小便不利熱淋之為病熱即發其尿血後如豆汁狀畜作有時五淋各異療方用雖故不載也

第五卷中白  
朱本作白

二十三

服字下宋  
本有忌海  
藥菴卷五

三七下宋  
本有忌海  
物也八字

宋本溫字  
下有再字  
相去如人  
行十里無  
所忘十字  
尚德按考  
字下疑脫

服字下宋  
本有服引  
相去如人  
行七八里  
久忌起也  
藥菴為等

下如下米  
本有字  
白宋本

范汪療五淋方

鹿蠱五分熱一斑狗二分去地膽二分去

右四味搗篩為散每服四分匕日

進三服夜二服但少腹有熱者去緒苓服藥二日後以器盛小便當有所下肉淋者下碎肉血淋者下如短繩若如肉膿氣淋者下如羹上肥石淋下石或下砂劇者十日即愈禁食美豬肉生魚葱鹽醋以小麥汁服之良

又療五淋仲良延命散方

滑石

礬石燒半石膏

車前子

露蜂房

變并白貝子搗著苦酒中二

相子仁

魚鱗熱令

雞矢白

苦瓠中穰并子

特牛陰頭毛

芒硝

各一分

白雞肌

脰裏黃皮

熱婦

人陰上毛

二分燒一本無

右十四味搗篩為散每服半錢匕加至一錢匕日三夜一服以麥子飲下之三日

愈甚者不過六七日愈小便以器盛之當見石及諸物也

並出第十卷中

必效療五淋方

白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升去滓分三四服

時後千金同

石淋方一十六首

病源石淋者淋而出石也腎主水水結則化為石故腎客砂石腎虛為熱所乘熱則成淋其病之狀小便

則莖裏痛溺不能卒出痛引少腹膀胱裏急砂石從小便道出甚者塞痛令悶絕

出第十卷中

范汪療石淋方

鼈甲燒灰搗篩為散酒服方寸匕頻服數劑當去石也

附後

又方取人家籬牆上連蔓律闊掘出見其根挽斷以杯於坎中承其汁服之一升石自當出若不出更

服一升

又方取車前子二升用絹囊盛之以水八升煮取三升去滓頻服之移日又服石當下也宿勿食服之

神良

附後十金同

又方

柏子仁

芥子

滑石

各等

右三味搗篩為散以麥汁飲服方寸匕日三服已效

又方

牛角燒灰

服方寸匕日五六服任意飲酒

又方

瞿麥子搗篩末酒服方寸匕日三服至一二日當下石又香薷搗作屑以酢漿飲服方寸匕日三

通按本草  
無律開別  
本作葛律  
即律草也  
又名防草  
尚德按開  
字當為下  
大開極究  
極作坎也

小至必更

卷二十二

石淋方一十六首



石字下宋  
本有小便  
於蓋中五  
字  
即字下宋  
本有便字

服字下宋  
本有無苦  
毒三字  
及宋本作

通接此方  
與前延命  
散同但多  
半角鯉石  
膏二味少  
卷石石膏  
雞腔脂三  
味

至二三日當下石並出第十卷中

小品療石淋方 浮石取滿一手搗為末以水三升苦酒一升煮取二升澄清溫服一升不過再服三服石

即出古今錄驗千金卷中

集驗療石淋方 鯉魚齒一升貝齒一升搗篩以三歲苦酒和分為三服宿不食旦服一分日中服一分

募服一分古今錄驗

文仲石淋方 桃膠如棗大夏月著三合冷水中冬月以湯三合和之一服日三當下石石盡即止千金

錄驗

又方 濃煮車前草汁飲之良也古今錄驗同

古今錄驗療石淋及諸淋方 石首魚頭石枕十四當歸等 右二味搗篩為散以水二升煮取一升頓服

立愈單用魚頭石亦佳

又石淋石葦散方 石葦去滑石分三 右二味搗篩為散用米汁若蜜服一刀圭日二服范注

又方 取生律葉搗絞取汁三升為三服石自出范注

又滑石散療石淋莖中疼痛瀝瀝晝夜百餘行內出石及血方 滑石分二十 石葦去當歸 通草 地膽

法足 鍾乳研各 車前子分三 瞿麥 蛇床子分細辛 蜂房炙各 右十一味為散以葵汁麥粥服方寸

匕日三生葱生米五字

又療石淋瀝瀝莖中痛晝夜百行或血出延命散方 滑石 牛角鰓燒 灰芒硝各二 瞿麥三 車前子 露

蜂房炙 貝子燒 柏子仁 魚齒炙 雞矢白 苦瓠子燒 牛陰頭毛各一 婦人陰上毛二分一 右十三

味搗篩為散以葵汁服方寸匕日三服

又療石淋方 取雞子陳者一枚用苦酒一升以雞子合苦酒置器中以油紙三四重密封頭不令水得

入沉井中一宿平旦取剝去皮吞其黃石即消去並出第十二卷中

血淋方五首

病源血淋者是熱淋之甚者則尿血謂之血淋心主血血之行身通遍經絡循環臟腑勞熱甚者則散失其常經溢滲入胞而成血淋也

出第十卷中

廣濟療血淋不絕雞蘇飲子方

雞蘇一握

石膏八分

生地黃一升

蜀葵子四分

右五味以

水六升煮取二升去滓和葵子末分溫二服如人行四五里久進一服

古金錄驗

范涿同

又療血淋小便疼痛方

雞蘇二握

石滑石五兩

右七味細

判以水九升煎取三升去滓分溫三服如人行四五里進一服

並出第四卷中

又方

灸足大指前節上十壯良

並出第六卷中

又方

小便赤色如紅方三首

延年論曰療小便赤色如淺紅花汁此是憂愁驚恐心氣虛熱客邪氣與熱搏於心所以小便赤心主南方火王在四月五月六月其色赤驚恐動於心心不受邪邪即傳於小腸滲入胞中所以小便赤此為微邪其病猶輕令服九子即得漸差心即是火火惡於清清即是水水能滅火既損心氣即不得食熱及冷水并勿憂愁如不慎恐小便色赤如血漸即難愈令處乾地黃丸補心神益脾氣散客熱自然調和小便色即自變如常第一不得憂愁在心并勿食熱食及冷水等方

乾地黃

黃耆各六

防風

遠志

茯苓

桂枝

芍藥

黃甘草炙戎鹽各三車前子

右十八味

歸為末以蜜及棗膏各半相和煎令消散和藥為丸如

梧桐子大每食後少時以粥清下十九日二三稍加至十五二十九以知為度

又茅根飲子療胞絡中虛熱時小便如血色方

茅根一握

茯苓

乾地黃

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

通按小蘇  
根疑是小  
蘇根  
服字下宋  
本有不利  
忌無憂  
蘇陳莫物  
十字

度字下宋  
本有禁熱  
食及冷水  
梅澤松葉

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方



益美附十  
三  
宋李云通  
草三兩  
子一升  
石四兩  
石二兩  
湯浸去毛  
右四味  
以水六升  
煎取二升  
去滓分服  
三服  
如人行八  
九里進之  
忌食五辛  
麝灸肉出  
第十卷中  
華字下末  
本有時進  
二字

商德接十  
金消石二  
分甘遂一  
分以麻子  
飲五合和

三服下米

升者取一升五合去滓分溫五六服一日食盡大仲通宋本一日食盡作中開任食一日今盡

大仲通草飲子主熱氣淋澀小便赤如紅花汁色方 通草 葵子 茅根 王不留行 蒲黃 桃膠

瞿麥 滑石 各一甘草 右九味切以水一斗煮取六升去滓分溫五六服忌如藥法

熱淋方三首

病源熱淋者三焦有熱氣轉於腎流入於胞而成淋也其狀小便赤澀亦有宿病淋今得熱而發者其甚則變尿血亦有小便後如似豆羹汁狀者畜作有時也出第十卷中

廣濟療熱淋方淋字下末本有車前草切一通草三兩葵根升一芒硝六分湯右四味以水七升者

取二升絞去滓內硝分溫三服用別相去如人行六七里微利為度忌熱食出第四卷中

古今錄驗療淋小便數病膀胱中熱滑石散方 滑石二兩枳實三兩石葦二分右三味搗篩為散以大麥

粥清服方寸匕三日並出第二十六卷中

近效療熱淋日夜數十度服藥不差方 空腹服井花水一二升必差葦鴻臚進用如神效方喫水了後

行六七百步甚良

勞淋方三首

病源勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎氣通於陰其狀尿留莖內數起不出引少腹痛小便不利勞

倦即發也出第十卷中

千金夫勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝灸之方 灸足太陰百壯在內踝上三寸三報之療與氣淋同

又療五勞七傷八風十二痺以為淋勞結為血淋熱結為肉淋小便不通莖中痛及少腹急痛不可忍者

方 滑石 仁王不留行 冬葵子 車前子 桂心 甘遂 通草 各二石葦 右八味搗篩為散

以麻子粥五合和服方寸匕日三服尿清差並出第二十一卷中

古今錄驗療石淋勞淋熱淋小便不利胞中滿急痛石葦散方 通草 二石葦 右二味搗篩為散

去皮王不留行 滑石 二

本有忌海  
藥按案  
李桂肉等  
十字

尚德按氣  
病源作虛

尚德按今  
有方一符

尚德按千  
金律草汁  
二升酢二  
合大作小

又按若疑  
當作若

甘草炙當歸各二白朮二瞿麥二芍藥二麥子二右十味搗碎為散先食以麥粥清服方寸匕日  
三服出第二十

氣淋方五首

病源氣淋者腎虛膀胱熱氣脈所為也膀胱與腎為表裏膀胱熱熱氣流入胞熱則主腎令胞內氣脹則  
小腹滿腎氣不能制其小便故成淋耳其狀膀胱小便皆澀尿澀當有餘澀是也亦曰氣癰診其少陰脈  
數者男子則氣淋出第十

千金療氣淋方灸關元五十壯

又方 夾玉泉相去一寸半灸三十壯

又方 水三升煮豉一升一沸去滓內鹽一合頓服之

又方 檮蓼子末湯和服方寸匕

又方 空腹單茹蜀葵一滿口

膏淋方二首

病源膏淋者淋而有肥狀如膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也出第十

千金療膏淋方 檮律草汁三升醋三合和空腹頓服當如大豆汁下一名葛律也

又膏淋之為病尿似膏自出療之一如氣淋也並出第二

許仁則淋方二首

許仁則療小便淋澀方此病有數種有石淋有熱淋有氣淋氣淋者氣擁塞小便不通遂成氣淋此病自  
須依前療水氣法石淋者緣先服石石氣不散擁遏生熱故成石淋熱淋者體氣生熱更緣食飲將息傷  
熱熱氣灼灼遂成熱淋更無餘候但若體氣熱小便澀出處酸澀宜依後瞿麥等六味湯大蟲蛄等五味  
散三淋俱服之方 瞿麥穗三冬葵子升榆白皮物切桑根皮兩白茅根升切石葦四兩右藥切以水

散三淋俱服之方 瞿麥穗三冬葵子升榆白皮物切桑根皮兩白茅根升切石葦四兩右藥切以水



一斗者取三升去滓分溫三服每服如人行十里久服三五劑後宜合大蟲魄五味散服佳

又方 大蟲魄六石葦三兩 翟麥穗四兩 冬葵子升 茯苓六兩 右藥搗碎為散者桑白皮作飲子初服一方寸匕日再服稍加至三七忌酢物下卷中

大便難方六首

尚德按病源五穀水穀難作上作提上向下一

尚德按張病源作脫宋本同

通按此即仲景麻仁丸方去杏人也

病源大便難者由五臟不調陰陽偏有冷熱虛實三焦不和則冷熱并結故也胃為五穀之海水穀之精化為榮衛其糟粕行之於大腸以出也五臟三焦既不調和冷熱博塞結在腸胃之間其腸胃本實而又為冷熱之氣所并結聚不宜故令大便難也又云邪在腎亦令大便難所以爾者腎臟受邪虛而不能制小便則小便便利津液枯燥腸胃乾澀故大便難又渴利之客大便亦難所以爾者為津液枯竭致令腸胃乾燥珍其左手寸口人迎以前脈手少陰經也脈沉為陰陰實者病苦閉悶大便不利腹滿四肢重身熱若胃脹右手關上脈陰實者脾實也病苦腸中怵怵一作伏如牢狀大便難脈緊而滑直大便亦難附腸微弦法當腹滿不滿者必大便難而脚痛此虛寒從下而上也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃臥直兩手掩左右脇除大便難腹痛脹中寒口內氣鼻出氣溫氣咽之數十病愈

出第十

肘後療脾胃不和常患大便堅強難方 大黃 芍藥 厚朴二兩 枳實六枚 麻子別研五合 右五味搗篩

入麻子蜜和為丸如梧桐子大每服十丸日三服稍稍增之以通利為度可常將之集驗方出第二卷中

千金療大便難方 灸承筋二穴三炷在臍中央陷中

古今錄驗療心腹脹滿大便不通方 芍藥六分 黃芩五分 大黃八分 芒硝六分 杏仁八分 右五味搗篩為末

鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸酒飲下加至二十丸取通利為度集驗方出第二卷中

近效療大便不通方 用豬膽和少蜜於鑊中熬令熟稠丸如棗大內下部中即差

大便祕澀不通方七首

尚經按騰  
字下千金  
有錄擇二  
字未本作  
無在蓋在  
字即拘字  
之說例見  
第十一卷  
中  
高德按七  
千金作十  
兩字下宋  
本有忌海  
藥松果五  
字

尚德按營  
病源作營  
下並同

千金療大便秘澀不通神方 猪羊膽 右一味以簡灌三合許令深入即出矣不盡須臾更灌一方加

冬葵子汁和之又有椒豉湯五合猪膏三合灌之佳

經心錄同

又三黃湯療下焦熱結不得大方便方

大黃三兩 黃芩二兩 甘草二兩 梔子一枚

右四味切以水五升煮取

一升八合分三服若秘加芒硝二兩

並出第十卷中

備急療卒大便秘澀不通方 葛氏云削爪道如指大導下部中即效

又方 燒亂髮灰三指捻投水半升一服

又方 綿裹鹽作三丸如指大內下部中

又方 煎蜜令強如乾薑末和丸如指導下部中姚云欲死者蜜三升微火煎如飴投冷水中令凝丸如

大指長三四寸導之良

又方 猪膽一枚內下部中姚云療七八日奔氣傷心欲死者須臾便通良

說注

大便失禁並關格大小便不通方二十二首

病源大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能溫制故使大便失禁

又關格大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通為關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也

陰氣大盛陽氣不得營之曰內關陽氣大盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得相營曰關格關格則

陰陽之氣痞結腹內脹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸

痛內關大小便不通日不得前後而手足寒者為三陰俱逆三日死也診其脈來浮牢且滑直者不得大

小便也

並出第十卷中

范汪療下部關不通方 取烏梅五顆著湯漬須臾出核取熟搗之如彈丸內下部中即通也

肘後

又方 取胡蘆根一把搗末水和絞去滓強人服一升數用有效兼療腳氣



又療大小便不通三陽實大便不通方 榆白皮兩桂心二兩滑石六兩甘草三兩 右四味以水一斗煮取

三升分三服集驗同並出第十六卷中

集驗療開格之病腸中轉痛不得大小便一日一夜不差欲死方 芒硝三兩煑三兩裹於炭火內燒令

沸安一升水中盡服之當先飲溫湯一二升以來吐出乃飲芒硝汁也附後

又方 單用豉清醬清羊酪土瓜根汁並單灌之立出注

又練中丸主宿食不消大便難方 大黃八兩厚朴二兩杏仁去皮芒硝各四兩 右四味搗篩為末鍊蜜為丸

如桐子大每服十九日三服稍加之並出第十卷中

備急不得大便或十日一月方 葵子二升水四升煮取一升去滓一服不愈重作服良忌蒜炙肉結驗

文仲范汪同姚方出第十六卷中

古今錄驗麻子仁丸療大便難小便利而反不渴者脾約方 麻仁二升別枳實枳實肆斤芍藥半斤大黃一斤厚

朴一尺杏仁一升去皮炙 右六味搗篩為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服飲下十九丸漸增至三十丸

日三服此本仲景傷寒論方出第二十六卷中

大便不通方一十七首

尚德樓施  
病源作健

病源大便不通者由三焦五臟不和冷熱之氣不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕痞結離塞不通

也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云龜行氣伏衣被中覆口鼻頭面正卧不

息九通微鼻出氣療開塞不通出第十卷中

肘後療大便不通方 研麻子以米雜為粥食之

又方 用礬石如指大者導下部並出第六卷中

千金療大便不通方 灸第七椎兩傍各一寸七壯

又方 桃皮三升水五升者取一升頓服

通按礬石  
一本作礬

尚德樓施  
金食後服  
七九

尚德按苗  
千金作葉

尚德按三  
千金作四

濕宋本作  
漢石鹽末下  
宋本有各  
一兩三小  
字

通按足大  
指本節後  
日此皆今  
云奇開雷  
是歧問也

尚德按千  
金以水二  
升煮五沸  
尚德按千  
金分三服  
尚德按千  
金分二服

又方 水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方 煮麻子取汁飲之

又方 當服蜜煎五合

又方 豬脂和陳葵子末為丸如梧桐子大每服飲下十九通即止

又方 常服車前子及齒並通也

又方 檗葵根汁服之良

又方 葵子一升牛酥一升豬脂亦得以水三升煮葵子取一升內酥煮一沸待冷分二服並出第十卷中

必效療大便不通方 牛膠一條長四寸葱白握右二味用水二升和煮消盡去滓頓服之並出第十卷中

又方 濕瓜蒂七枚綿裹內下部如非時醬瓜亦得並出第十卷中

崔氏療大便不通方方字下宋本有文葛蒲末 石鹽末 右二味相和取半匕和烏麻脂少許綿裹

內下部中即通

又方 豬脂一升溫酒一服令盡良並出第四卷中

千金療老人小兒大便失禁方 灸兩脚大姆指去爪甲一寸三壯

又方 灸足大指奇間各三壯

又方 瘡大小便不通方 灸臍下一寸三壯

又方 灸橫文一百壯

又方 葵子升一竹葉 右二味以水一升煮一沸頓服之

又方 葵子升一榆白皮 右二味以水五升煮取二升分二服

又方 水三升煮葵子一升去滓取一升內猪膏一升空肚一服

又方 鹽半升合蜜三合同煎如飴出之著冷水中丸如指大深內下部中立通並出第十卷中

大便不通方一十七首 關格脈滿不通方四首



尚德接千  
金治大便  
不通

通字下家  
本有叔方  
二字

尚德接吐  
去水三字  
疑當大書

尚德接千  
金飲服十  
五丸加至  
二十九丸  
通利為度

外吉室和要

千金翼濡藏湯主大小便不通六七日腹中有燥糞寒熱煩迫短氣汗出腹滿方 生葛根二斤 栝膏二斤

大黃切一兩 右三味以水七升煮取五升去滓內膏煎取三升澄清強人頓服之出第 瀉人分再服卷中

備急葛氏療卒關格大小便不通支滿欲死二三日則殺人方 鹽以苦酒和塗臍中乾又易之火效

陶氏卒大小便不通方 熱裹鹽燒投水中服之

姚氏風寒冷氣入腸急痛堅急如吹狀大小便不通或小腸有氣結如升大脹起名為關格病

又療大小便不利方 苦參 滑石 貝齒略等 右三味搗篩為散每服飲下一匕或煮薤根汁服之

彌佳大仲同出 第六卷中

古今錄驗療關格大小便不通方 以水三升煮鹽三合使沸適寒溫以竹筒灌下部立通也

又療大小便不通方 通草四兩 郁李仁三兩 去皮車前子五合 一黃芩三兩 朴硝四兩 瞿麥三兩 右六味切以水八

升煮取二升去滓分三服經心 同

又方 取生土瓜根搗取汁以水解之於筒中吹內下部即通並出第二十六卷中

經心錄療關格大小便不通方 芒硝 烏梅 榆白皮各五兩 芍藥 杏仁去皮 麻子仁三兩 大黃八兩

右七味切以水七升煮取三升分為三服一方無烏梅加枳實乾地黄各二兩

又療大小便不通方 滑石二兩 葵子 榆白皮各一兩 右三味下篩為散煮麻子汁一升半取二匕和服

兩服即通並出第二卷中

近效療大小便不通方 含硝石吐去

關格脹滿不通方四首 芍藥六分 芒硝六分 黃芩五分 杏仁八分 去尖 大黃八分 右五味末之蜜和丸如桐子

千金療關格脹滿不通方 飲下十九日二服良

又方 獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通刺薑是鹽導子並佳 尚德按表鹽千金作以鹽

日三  
尚能持十

金八兩  
半各一兩

真珠半兩  
宋本諸字

下有旦字  
忌海藥法

菜生處生  
藥血物等

十三字

利字下家  
有矣字

服字下家  
本有不利

忌蕪菜  
炙肉等

物粘食等

又方 乾薑 鹽 杏仁 右三味等分搗導之

又療脹滿腸不通方 吳茱萸一升 乾薑 大黃 桂心 當歸 芍藥 甘草炙 芎藭各二兩 雞黃三分

研人參 細半各四兩 真珠研一分 桃白皮一升 右十三味切以水一斗煮取三升去滓內雞黃真珠米酒

一升微火煎三沸服一升得下即止不必盡也每服如人行十里久進之並出第十卷中

許仁則大便暴閉不通方二首

許仁則論曰此病久無餘候但由飲食將息過熱氣壅積秘結若鬱氣秘自煩仍前療氣法服巴豆等

三味丸及療水氣薏苳等諸方取利若是風秘自依後服大黃等五味丸暴秘之狀背內強痛體氣煩熱

唇口乾焦大便不通宜依後大黃芒硝二味湯取利方 大黃六兩 芒硝五兩 右藥先切大黃以水四升煮

取二升去滓內芒硝頓服之須臾利良久不覺以熱飲投之若服此依前不利宜合後大麻仁等五味

丸服之取快利

五味大黃丸方 大黃五兩 大麻子一升 薏苳六兩 乾葛 桑根白皮各五兩 右五味先搗四味為散然後

搗麻仁令如膏即投四味散和搗和少蜜搗之丸如梧子大初服十丸日再服稍稍服得大便通為限

主大便風秘不通吳昇同出下卷中

小便不通方一十三首

病源小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於小腸入胞

者為小便腎與膀胱逆熱熱入於胞熱氣大盛故結澀令小便不通少腹脹氣急甚者水氣上逆令心急

腹滿乃至於死診其脈緊而滑直者不得小便也出第十卷中

廣濟療下冷疼小便不通雞蘇飲子方 雞蘇握通草 石葦一兩 炙冬葵子半兩 杏仁二兩 滑石二兩

生地黃四兩 右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服如人行四五里進一服

又方 冬葵子五兩 通草三兩 茅根四兩 芒硝二兩 茯苓三兩 滑石五兩 右六味切以水九升煮取三升去滓內

小便不通方一十三首 小便難及不利方九首



十八字  
聖字下米  
本有通  
肉熱食  
物等物  
得字下米  
本有通  
物等物  
肉等八字

通字下米  
本有通  
二字

芒硝分溫三服服別相去如人行六七里

又方 茯苓二分大黃六分當歸 枳實 白木 人參各二分大麻仁四分 右八味切以水六升煮取

二升去滓分溫三服要著芒硝亦得並出得四卷中

崔氏療小便不通方 取重黃如豆許末之內小孔中神良

又方 桑根白皮 豬苓去通草 右三味切以水六升煮取二升分三服

又方 雞屎白如彈丸以苦酒和服即下不過三四服佳一本云

又方 足大姆指奇間有青脈鍼挑血出矣三壯愈並出第

救急圭小便不通方 取印成鹽七顆搗碎作末用青葱葉尖盛鹽末開便孔內葉小頭於中吹之令鹽

末入孔即通非常之效

又方 取嫩穀木梢濃汁可飲半升以來即愈

必效療小便不通不得服滑藥急悶欲絕方 鹽二升大鑊中熱以布綿裹熨臍下按之小便當漸通也

附後

古今錄驗療熱結小便不通利方 刮滑石屑水和塗少腹及繞陰際乾復塗之附後

又方 取鹽填滿臍中大作艾炷灸令熱為度良附後千金同並出

近效療小便不通數而微腫方 取陳久筆頭燒作灰和水服之

小便難及不利方九首

病源小便難者此是腎與膀胱熱故也此二經為表裏俱主水水行於小腸八胞為小便熱氣在於臟腑

水氣則澀其熱勢微故但小便難也診其尺脈浮小便難尺脈濡小便難尺脈緩故小便難有餘滯也出

卷中

集驗療小便難淋瀝湯方 滑石八兩石葦三兩榆皮一升葵子一升通草四兩 右五味切以水一斗煮取三升

尚德按千金通草茯苓各三兩

分三服一方加黃芩三兩

又療淋小便不利陰痛石韋散方

石韋二兩瞿麥二兩滑石五兩車前子三兩葵子二兩右五味搗篩為散服

方寸匕日三並出第五卷中

千金療小便不利莖中痛少腹急方

通草二兩葵子三兩茯苓二兩右三味搗為散以水服方寸匕日

三服忌醋物出第二十卷中

備急療小便不利莖中痛劇亦療婦人血結腹堅痛牛膝飲方

生牛膝一名牛唇掘取根煮服之立差

同肘後

陶效方 秦羌二兩冬二兩瓜子二兩

右二味搗為末酒服一匕日三服神良附後

又仲療小便不利分

桑螵蛸十兩黃芩一兩右二味切以水一升煮取四合頓服之良附後

又方 蒲黃 滑石各一

右二味為散酒服一匕日三大服同肘後

又療諸淋及小便常不利陰中痛日數十度起此皆勞損虛熱所致常將散服方

石韋三兩滑石五兩車前子三兩無

王不留行 葵子各二

右六味搗篩為散每服方寸匕日三服之姚方加滑石五兩車前子三兩無

王不留行備之同出第四卷中

古今錄驗療淋胞痛不得小便滑石散方

滑石 葵子 鍾乳各一桂心 通草 王不留行各半

右六味搗篩為散先食訖以酒服方寸匕日三服忌生葱出第二十卷中

遺尿方六首

病源遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也膀胱為足太陽腎為足少陰二經為表裏腎主水腎氣下通於陰小便者水液之餘也膀胱為津液之府府既虛冷陽氣衰弱不能約於水故令遺尿也診其脈來過寸口入魚遺尿肝脈微滑亦遺尿左手關上脈沉為陰絕者無汗脈也若遺尿尺脈實少腹卒痛小便不禁尺中虛小便不禁腎病小便不禁脈當沉滑而反浮大其色當黑及黃此土之剋水為逆不治其渴

通按左手關上肝脈也無汗是無肝



尚德按病  
源魚字下  
有際字作  
肝趾作

尚德按十  
金防風二  
雨

尚德按各  
字疑衍

尚德按十  
金方酒服

健鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云踣踞高一尺許以兩手從外屈膝至跌上急手

握足五趾極力一通令內曲以利腰膈瘳遺尿也出第十卷中

集驗瘳遺尿方 取雄雞腸熨尿為末用三指一撮服之朝暮服當愈范汪同出第五卷中

千金瘳遺尿小便澀方 壯蠅熬鹿茸炙各四兩桑耳三兩阿膠炙二兩 右四味切以水七升煮取二升分為二

服作散以飲送之經心

又方 木防已二兩葵子二兩防風三兩 右三味切以水五升煎取二升半分溫三服作散亦佳古今錄驗同

古今錄驗壯蠅湯瘳遺尿小便澀方 壯蠅熬鹿茸炙各四兩阿膠炙桑螵蛸各二兩 右四味切以水五升煮

取二升分再服

又方 桑耳三兩礬石二兩阿膠二兩龍骨三兩 右四味為散空心服方寸匕日三服

又方 桑耳二兩壯蠅三兩礬石二兩 右三味搗歸為散酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

尿血方一十一首

千金瘳房損傷中尿血方 壯蠅熬車前子 桂心 黃芩 右四味等分搗歸為散飲服方寸匕日三

服不知加至二匕忌生葱出第二十卷中

崔氏瘳卒傷熱行來尿血方 大黃末芒硝末 右二味冷水和頓服立止三日內禁如藥法出第四卷中

古今錄驗瘳尿血鹿茸散方 鹿茸炙當歸 乾地黄各二兩 桑子五兩黃各五兩 右五味搗歸為散酒服方

寸匕日三服忌蕪荑出第二十卷中

蘇澄瘳尿血方 車前草搗碎取汁五合空腹服之差

又方 水服亂髮灰方寸匕日三服附髮十金同

又方 服益母草汁一升差一云

通按自膠  
阿膠皆主  
尿血黃明  
膠亦主血  
淋不知此  
用何味  
通按尿血  
方中有用  
水并汁者  
此云水筋  
疑誤

尚德按痛  
源機作重  
因急作急  
因

已字下宋  
本有三字

通按在夫  
作在卷

尚德按黑  
疑當作黑

又方 車前三升水五升煮取二升分三服

又方 棘刺二升水三升煮取二升分三服差

又方 膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方 酒服蒲黃二方寸匕日二服水服亦得

又方 搗水筋汁服六七合日一服

### 胞轉方一十五首

病源胞轉者由是胞屈辟小便不通名為胞轉其病狀臍下急痛小便不通是也此病或由小便應下強忍之或為寒熱所迫此二者俱令水氣上逐氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內波應出不得出外內相擁塞故令不通此病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便因急奔走或忍尿入房亦皆令胞轉或胞落並致死

出第十  
四卷中

肘後療卒小便不通及胞轉方 取雞子中黃一枚服之不過三服佳

備急  
同

又方 水上浮萍暴乾末服之小便不通利水脹流腫佳

千金  
同

又方 灸桑蟬蛸轉為末水服之方寸匕日服良效

又療小便忍久致胞轉方 自取爪甲火燒服之

備急  
同

又方 取染上塵三指撮以水服之神效

又方 服蒲黃方寸匕日三服良

范汪療胞轉不得小便方 用蒲席捲人倒立令頭至地三反則通

肘後  
同

又方 雀天合半車前子 滑石各四兩通草 芍藥各二兩 右五味切以水七升煮取三升服五合日三先

### 食服立愈

又療胞轉欲死及夫溺方 取豆醬清和龜突中黑如豆大內陰孔中立愈

並出第十  
五卷中



真字上宋  
本有吸本  
二字  
宋本无字  
下有土程  
妻三字容  
作容

尚德按初  
字下疑有  
脫字  
又按朱節  
以下發雷  
別揭

通接神會  
在十一推  
今云十推  
誤矣

備急療卒小便不通及胞轉方 車前草一斤水一斗煮取四升分四服小品同出  
古今錄驗療胞轉小便不通亂髮散方 亂髮三斤洗滑石半斤鯉魚齒兩 右三味搗篩為散以飲服方

寸七日三服良

又療胞轉不得小便方 真琥珀一兩葱白十四 右二味以水四升煮取三升去葱白末琥珀細篩下湯

中溫服一升日三服佳范汪

又張苗說有容忍小便令胞轉大小便不得四五日困篤欲死無脈服此差方 滑石二兩亂髮三兩 右

二味搗下篩取生桃白皮一斤熟春以水合絞得汁二升以汁服散方寸七日三服即愈其但淋者取

亂髮三兩燒灰滑石五兩合搗為散服方寸七日三服

又說不得小便者為胞轉或為寒熱氣所迫肥屈辟不得充張津液不入其中為尿及在胞中尿不出方

當以葱葉除尖頭內入莖孔中吹之初漸漸以極大吹之令氣入胞中津液入便愈也未郁用此藥療

郭虎將十五歲男用 葵子升通草 甘草各二兩石葦一兩半滑石四兩榆皮二升 右六味以水一斗煮

取三升令服范汪同並出第 小便血及九竅出血方一十二首

小品療小便血菟絲丸方 菟絲子 蒲黃 乾地黄 白芷 荆實 葵子 敗醬 當歸 茯苓

芍藥各二 右十味合搗為末以白蜜和丸如梧子大飲服二九日三服不知加至五六丸劉洪紀方

已效常服忌酢物葷羹范汪同 又斷血諸方所云下血者其從腹裏出者悉為下血也有痔病血從孔邊出者別尋痔方出第

千金療小便出血方一本云以下治 灸脾俞百壯在第十椎

又方 灸三焦俞百壯在第十三椎

又方 灸腎俞百壯在第十四椎

升字下宋  
本有分十  
服三字  
尚德按千  
金黃卷二  
兩以水八  
升煮  
此法以下  
十二字宋  
本大書

尚德按葉  
字下千金  
莫有多字  
宋本同  
秋千金翼  
作兩  
通按硝石  
疑是滑石  
通按藥只  
七味後云  
八味疑有  
缺

又方 炙章明百壯在季脇端

又方 榆皮二斤水二斗煮取五升令服之佳

又方 撫乾羊骨下篩水服方寸匕日三服

又治小便血方 生地黃兩柏葉肥黃芩兩阿膠兩 右四味切以水七升煮取三升去滓內膠分三服

並出第二十一卷中

文仲療小便出血方 生地黃汁一升生薑汁一合 右二味相和頓服不差更作

此法許令公處云極效附後同

又方 炙足第二指本第一文七壯立愈

附後同

又方 龍骨末二方寸匕溫酒一升服之日三服

派師附後同注陶氏同

又方 當歸四兩酒三升煮取一升頓服之

肝旋深師范王同並出第六卷中

小便不禁方二首

病源小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主水其氣下通於陰腎虛下焦冷不能溫制其水液故小便不

禁也

出第十卷中

千金療小便不禁日便一二斗或如血色方 麥門冬去乾地黃各八錢葵子 桂心 續斷各二甘草

一 枚乾薑兩 右七味以水一斗煮取二升五合分三服

服字下宋本有忌海藻

又久房散主小便多或不禁方 尚德按千金翼久作九菟絲子三兩無五 范絲子二兩蒲黃 黃連各

兩硝石一兩從容兩玉味子 雞肫腔中黃皮兩各三 右八味搗篩為散每服方寸匕日三服每服如

人行三四里又服 並出第十五卷中 又按千金翼用硝石本無可異者未審散通何由疑其

人行三四里又服 並出第十五卷中 又按千金翼用硝石本無可異者未審散通何由疑其

小便數及多方五首

病源小便數者膀胱與腎俱虛而有客熱乘之故也腎與膀胱為表裏俱主水腎氣下通於陰此經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行溫溫則小便不快故令數起也診其脈踰陽脈數胃



外臺祕要

卷二十七

許仁則小便數多方四首

十一

中有執即消引食大便必鞭小便則數其湯尉鍼石別有正方補養寧導今附於後養生方導引法云

以兩踵布膝除數尿

出第十卷中

范汪療小便數而多方

黃連

苦參各二麥門冬去心

兩土瓜根

龍膽

各一

右五味搗篩以蜜丸如

梧子每服十丸加至二十丸良

一方無苦麥有黃芩

又方 栝蒌

十黃連分五

右二味搗篩為散每服方寸匕日三良

又方

瞿麥

二滑石兩秦子升黃芩

甘草

炙略

右五味切以水六升煮取三升去滓一服六合

又方

桃仁

一味咬咀酒一升煮三沸去滓分為三服強人服盡之

並出第十卷中

集驗療小便數而多方

羊肺羹內少許羊肉合作之調和鹽如常食之法多少任意不過三具效

第五卷中

許仁則小便數多方四首

許仁則論此病有二種一者小便多而渴飲食漸加肌肉漸減乏氣力少顏色此是消渴一者小便雖數而不至多又不渴飲食亦不異常或不至多能食但稍遇天寒冷即小便多更無別候此是虛冷所致大都兩種俱緣腎氣膀胱冷不差便能殺人腎虛腰冷無所為害若候知是消渴小便數宜依後按莫等八味湯黃耆等十四味丸并竹根等十味飲小麥麵等十四味煎以次服之

按莫八味湯方

按莫

土瓜根

略三黃耆

地骨皮

五味子

略四人參兩石膏

兩牡蠣兩

切以水一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里服一劑服至五六劑佳隔五日服一劑劑數

滿宜合後黃耆等十四味丸服之

又黃耆十四味丸方

黃耆

黃連

土瓜根

略五苦參

兩玄參

栝蒌

地骨皮

草

略牡蠣

人參

桑螵蛸

三兩五味子升

右藥搗篩為末蜜和為丸用後竹根飲下之初服十

五九日二服稍加至三十丸如梧桐子大忌豬肉冷水

宋本無此  
 一行九字  
 宋本小字  
 上有又字  
 麥字下有  
 挺字  
 尚通按一  
 片當當作  
 一斗  
 中字下宋  
 本有方中  
 只十二味  
 元欠一味  
 十字

又竹根飲子方 薑竹根 生茅根 蘆根各切 石膏并切 烏梅三十 生薑切 小麥三升 竹根

升白蜜升 右藥以水五斗者取一斗去滓內竹根及蜜若小津飲之下前丸 雖不下丸但覺口

乾及渴即飲之如執月即逐日斟酌煎之多則惡寒也如不能飲此飲且用烏牛乳下丸及解渴日服

丸反飲夜中惡虛也宜合後小麥麴等十四味煮細細合噉之

又小麥麴十四味煎方 小麥五升以水硬漚之別於水中揉挺令麴粉盡麴筋別成一塊即止以此麴

粉汁別器澄停漚却清汁即以稠粉盛於練象子中漚若令微燥生薑根五挺徑三寸長二尺碎挺於

水中揉挺合葛根中粉汁盡別器澄停盛乾一如小麥麴法生括薑五斤搗如上法胡麻三升去皮熬

令熟為散薑竹根切一斤生茅根切一斤生蘆根切一斤烏梅五十個以上用水五斗緩火煎取一升

半去滓澄取清冬瓜汁二升生麥門冬汁三升生薑汁一升牛乳一升白蜜二升先取竹根等汁和冬

瓜以下汁微火上煮減半次內牛乳白蜜又煎六七沸投小麥麴粉生薑粉括薑粉胡麻散於諸汁中

煎和熟攪之勿住手候如稠糖即成或乾止火待冷別器中每夜含如此初服一棗大稍稍加至一

尿狀方六首

病源人有於眠睡不覺尿出者是具稟質陰氣偏盛陽氣偏虛則膀胱堅氣俱冷不能溫制於水則小便

多或不禁而遺尿尿足太陽也為腎之府腎為足少陰為藏與膀胱合俱主水凡人之陰陽日入而陽

氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則臥睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞為小便夜臥則陽氣

夜伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於眠睡而不覺尿出也四卷中

千金療尿床方 羊肚系盛水令滿急驚兩頭執煮開取水頓服之立差

又方 雞臍脰一具并腸蒸乾水酒服之男服女雄也

又方 羊胞盛水滿中炭火燒之藍肉是朝空腹服之不過四五頓差



尚疑按熱  
作飯千金  
本作熱膏  
飯  
補家本作  
蠶

又瘰癧方 新收熱瘰癧一盞瀉瘰癧處并之收取與食之勿令知

又方 垂兩手脾上盡筋處灸七壯又灸臍橫大七壯並出第十二卷中

近效瘰癧方 取麻鞋乳帶及鼻根等唯不用底須七輒以水七升煮取二升分再服

灸穴雜法一十二首

千金翼灸五淋法 灸大敦三十壯

又石淋臍下三十六種瘕不得小便法 灸關元三十壯一方云百壯

又血淋法 灸丹田穴隨年壯良

又方 灸復溜穴五十壯一云隨年壯

又尿黃法 灸石門穴五十壯

又遺尿法 灸道通俠玉泉五寸隨年壯

又法 灸陽陵泉穴隨年壯

又失禁尿不自覺知法 灸陰陵泉穴隨年壯

又莖中痛法 灸行間穴三十壯

又腹滿小便數法 灸屈骨端二七壯

又淋痛法 灸中封穴三十壯亦隨年壯

又小便不利及轉胞法 灸心下八寸七壯以上穴並出第二十七卷中

尚德樓今  
有方九首

唐王壽先生外臺秘要方卷二十八目錄

中經法門  
死一十八門

中惡方一十三首

卒死方二十四首

客忤方一十三首

卒瘞方二十一首

鬼擊方一十首

尸厥方一十二首

中蠱毒方二十一首

蠱吐血方一十首

蠱下血方九首

五蠱方一十二首

蠱注方三首

蠱毒雜療方五首

猶鬼野道方三首

自縊死方一十五首

熱喝方七首

溺死方九首

凍死方一首

人井墮悶方二首





唐王壽先生外臺秘要方卷二十八

宋朝 散大夫字光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安 後學 程衍道 敬通 父訂梓

中惡方一十三首

病源中惡者是人精神衰弱為鬼邪之氣卒中之也夫人陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干正若將  
攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脈緊大而  
浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升脈沉數細者死浮者生如疾者生中惡有差後餘勢停滯發作則  
變成症

通按此方  
古尚德按有  
病源作者

又中惡死候中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是客邪暴感陰陽為之離絕上下不通故氣暴厥絕如  
死良久其真氣復則生也而有乘年之良逢月之空失時之和謂之三虛三虛而腑臟衰弱精神微羸中  
之則真氣竭絕則死也其得差者若餘勢停滯發作則變成症並出第三十三卷中

廣濟療卒中惡心腹刺痛去惡氣方

麝香研一分青木香二分生犀角二分

右三味為散空心熟水服方寸

匕日二立效未止更作忌如常法

出第四卷中

肘後華佗療中惡短氣欲絕方 灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二七壯即愈又法三七壯集腋補

同急

又方

杏仁七十枚桂心二兩甘草一兩麻黃三兩去節方四兩

右四味切以水八升煮取三升分三服含噉之

通療諸客忤良忌如常法

如常法米本作海藻生葱蒜菜等物八字

又方 韭根七烏梅十四菜菔半升 右三味切以勞水一升煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死

煮取三升飲之大效

又方

桂心一兩生薑三兩梔子十四豉五合

右四味搗碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐為度並出第一卷中

尚德按肘  
後烏梅二  
十箇炙  
半斤以水  
尚德按肘



後用酒三升

作字下家

本有強字

尚德按

出字下疑

脫第字

握家本作

胡豆大五

犀字下家

本有新故

並得一物

若新八字

宋本云取

貢珠書舌

作鬼字額

上亦書之

大良

尚德按

病源作聖

集驗療中惡通尸心腹及身體有痛處甚者短氣不語手摸按之得其痛處則病色動惡人近則是痛處

方 取艾葉按碎著痛上厚寸餘鑊中煮湯和灰作泥令熱薄艾上冷輒易之不過再著則愈出文

又療中惡心痛胸脅痛喘急湯方 桃東行枝白皮生薑真珠兩一梔子仁四桂心各三

附子兩香豉各五吳茱萸各五右九味切以水八升煮取二升去滓內真珠分二服忘如常法同

又方 仰臥以物塞兩耳以兩個竹筒內死人鼻中使兩人痛吹之塞口傍無冷氣得出半日所死人即

噫噫勿復吹也千金方又按鼻中千金作口中

又方 搗皂莢細辛屑吹兩鼻孔中單用皂莢末亦佳千金方並出

刪繁療中惡痛欲絕方 釜底墨五鹽一撮 右二味和研以水一升攪調一服范汪

又方 牛屎絞取汁五合為一服口不開和齒內藥若無新者乾者即以水和取汁並出第

崔氏療卒中惡氣絕方 取真珠研末書鬼字於舌上額上亦書鬼字驗

又方 灸右肩高骨上隨年壯並出第

卒死方二十四首

病源卒死者由三虛而遇賊風所為也三虛謂乘年之衰一也乘月之空二也失時之和三也人有此三

虛而為賊風所傷使陰氣偏竭於內則陽氣阻隔於外二氣擁閉故暴絕如死也若腑臟氣未絕者良久

乃蘇然亦有挾鬼神之氣而卒死者皆有項邪退乃活也凡中惡及卒忤卒然氣絕其後得蘇若其邪氣

不盡者停滯心腹或心腹痛或身體沉重不能飲食而成宿軫者皆變成症

又卒忤兒候犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於腑臟使陰陽離絕氣血暴不通流奄然厥絕如死狀也良

久陰陽之氣和乃蘇若腑臟虛弱者死亦有雖蘇而毒氣不盡時發即心腹刺痛連滯變成症也並出第

甲乙經云黃帝問於岐伯有卒死者何邪使然答曰得三虛者暴疾而死得三實者邪不能傷也黃帝曰

三



又方 令人痛爪其人入中取醒不起者捲其手灸下文頭隨年壯

又方 灸鼻下人中三壯

又方 灸臍中百壯

又方 半夏末如大豆許吹鼻中

又方 搗蘆若韭取汁以灌口鼻中張文仲集驗范汪同

又方 猪膏如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中集驗肝後

又卒死而壯熱者方 磐石半斤煮以漬脚令沒踝出第一卷中

備急療卒死而目閉者方 騎牛臨其面搗蘆汁灌耳中末皂莢吹鼻中集驗文仲附

又療卒死而張目反折者方 灸手足兩爪甲後各十四壯飲以五毒諸膏散有巴豆者良肝後張文仲同

又療卒死而四肢不收失便者方 馬屎一升水三斗煮取二斗以洗足又取牛糞一升溫酒和灌口中

肝後

又方 灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各百壯肝後

又卒死而口噤不開者方 縛兩手大姆指灸兩白肉中二十壯肝後文仲范汪同

集驗療卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也方 牽牛臨鼻上二百息又灸臍下以熨兩脇下鍼兩間使

各百餘息灸人中

又療卒死而有脈形候陰氣先盡陽氣後竭故也方 嚼蘆哺灌之肝後文仲千金范汪

古今錄驗司空三物備急散療卒死及感忤口噤不開者方 巴頭去心乾薑 大黃各等 右藥搗篩

為散服如大豆許二枚以水三合和之腹脹煩熱飲水能多益佳

又療心腹痛幾死服此丸令小刺差如腹常滿痛當令得下差一方服一刀圭以酒下之不能刀圭者便

丸如大豆許四枚不知復加一豆許不差又加一豆許若病者口噤不能自飲撮口含之藥不須合預合

宋本此條與上方校文接合為一條病後

尚德樓頭疑心胃作豆

死服作病  
活死人令  
字下有得  
字利差誤

利佳服字  
能字之正  
有如字誤

史二字誤  
作二下所  
尚德按本

即治源作  
氣字下本  
本有見竟

觸之其氣  
有夜歐故  
不能言人

如句然惡  
氣十九字

尚德按今  
字上時後  
有轉字來

本同  
尚德按時  
後取字單

作稍稍步  
許第五字  
草書作第

盡本末同

客忤方一十三首

出第四  
卷中

病源卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒犯忤人精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有魂魄衰弱者則為鬼氣所犯忤喜於道間門外得之其狀心腹絞痛脹滿氣衝心胸或即悶絕不復識人肉色變異臍腹虛竭者不瘳即至於死然其毒氣有輕重輕者微瘳而差重者侵尅腑臟雖當時救瘳餘氣停滯久後猶發乃變成症出第二十卷中

時後論曰客者客氣也忤者犯也謂客氣忽犯人也此惡鬼毒厲之氣瘳之多愈亦有侵尅臟腑經絡雖差後猶宜治瘳以消餘勢不爾終為人患有時輒發

又客忤死者中惡之類也喜於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即瘳亦殺人方 灸鼻下人中三十壯愈備急大

又方 以水漬梗米取汁二升以飲之口已瘳者以物強發之

又方 以銅器瓦器盛熱湯器著腹上冷者徹去衣器襯肉大冷者易以熱湯取愈也

又方 先以衣三重藉腹上以銅器著衣上取茅草於器中燒之草盡再益勿頓多也取愈乃止備急大

又方 以繩橫其入口以度度臍四面各一處灸三壯令大俱起也

又方 楷度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯也並出第

又瘳客忤心腹絞痛脹滿氣衝心胸煩躁壯熱或氣悶絞刺鬼魅之氣未散方 麝香一錢茯神 人參

天門冬法鬼臼 葛蒲等 右六味蜜丸如桐子服十九日三

文仲扁鵲瘳客忤有救卒死符並服鹽湯法恐非庸世所能用故不載而此病即令人所謂中惡者與卒

死鬼學亦相類焉瘳皆參取而用之已死者方 搗生葛蒲根絞取汁含之即愈備急

又瘳卒忤停尸不能言者方 燒桔梗二枚末飲服之



尚德無忌  
然病源作  
勿也

尚德無忌  
中三字  
又按去字  
下宋本有

又方 細辛 桂心分等 右二味內口中肘後備

又卒忤口噤不開者方 生附子末置管中吹內舌下備急肘後同並

千金瘧客忤逆氣方 吞麝香如大豆立驗出第五卷中

千金翼客忤方 灸間使七壯又肩井百壯又十指甲下各三壯出第二十卷中

卒魔方二十一首

病源卒魔者屈也謂夢裏為鬼邪之所魔屈也人卧不寤皆是魂魄外遊為他邪所執錄欲遂未得致成魔也忌火照火照則魂魄遂復入乃至於死而人有於燈光前覺者本由明出所以不忘火也其湯熨針石別有正方補養宣導令附於後養生方導引法云拘魂門前魄戶名曰握固法屈大拇指着四小指內抱之積習不止眠時亦不復開令人不魔魅又云人魔忽然明喚之魔宛宜聞喚之好唯得遂喚亦不得近而急喚亦喜失魂魄也又魔不寤候人眠睡則魂魄外遊為鬼邪所魔屈其精神弱者魔則久不得寤乃至氣暴絕所以須傍人助喚並以方術療之即蘇也並出第二十三卷中

肘後療卒魔解不寤方 卧忽不寤勿以火照之殺人但痛醫其脚腫及足拇指甲際而多唾其面則覺也

又方 皂莢末以竹筒吹兩鼻孔中即起三兩日猶可吹之也

又方 以筆毛刺兩鼻孔男左女右展轉進之取起也集驗仲景大

又方 持雞取汁吹兩鼻孔冬日取韭絞汁灌口集驗仲景大

又方 以蘆管吹兩耳並取其人髮二七莖作繩內鼻孔中割雄雞冠取血以管吹喉咽中大良並出第一卷中

集驗療卒魔方 以鹽湯飲之多少任意並嚙其足大指爪際痛嚙之即起也肘後文仲

又方 以其人置地取利刀畫從肩起男左女右盡地令周過訖以刀鋒刺病人鼻下人中令人一分急

持勿動其人當還語求去乃問阿誰以何故來自富已去也乃以指滅向所畫地當肩頭數寸令得

不可具結  
問之矣  
字附後同  
但不可作  
不可不矣  
作也

去

又方 雄黃細篩管吹兩鼻孔中佳並出第

崔氏主卒魔方 以瓶帶在索縛其肘後男左女右用餘猶急絞之又縛牀脚乃詰問其故附後古今

崔氏云療卒狂鬼語方以瓶帶急令縛兩手大指便灸左右脇下屈肘頭尖各七壯須臾鬼語自道姓

名乞去徐詰問乃解其手

大仲療卒魔方 令一人坐頭邊守一人於戶外呼病人姓名坐人應曰在便魘活也附後

又人喜魘及惡夢者方以下並取燒死人反著履中令枕之

又方 帶雄黃男左女右也

又方 枕麝香一分於頭邊佳入灌香少許

又方 以虎頭為枕佳

又方 取雄黃如棗核繫左腋下令人終身不魘也集驗方

又方 作犀角枕佳

又方 青木香內枕中并帶之亦佳並出第

千金小定心湯療虛癇心驚悸多魘方 茯神四分一本甘草 芍藥 乾薑 大棗枚五遠志去心人

參 桂心各二 右八味切以水八升煮取三升分三服日三忌如常法

又大定心湯療心氣虛悸恍惚多魘或驚悸驚魘志少不足方 人參 茯苓 茯神 遠志去心赤石脂

龍骨 乾薑 當歸 甘草 炙白朮 芍藥 大棗 桂心 防風 紫菀各二 右十五味切以水

一斗二升煮取三升半分五服日三夜二忌如常法

千金翼療卒魔不覺方 灸兩足大指紫毛中二十一壯是注同出第

備急療卒魔不寤方 末施下黃土或雄黃桂心末亦得 右以盧管吹入兩鼻孔中大仲同出

尚德按千  
金炭卷四  
兩甘草芍  
藥乾薑各  
二兩桂心  
三兩分四  
服日三服

大仲同出  
第一卷中



通按此門只九方內缺一方

尚德按因病源作同

宋本同

尚德按膝字下肘後

有取字宋本同

尚德按肘後用渴而

尚德按至

肘後作笑

宋本同

通按現微

殺二青男

丑也振音

拜上聲損

音墳擊也

纂宋本作

入宋下宋本有方字

鬼擊一十首

尚德按擊字下脫脫方字

病源鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名為鬼排言鬼排觸於人也氣血虛弱精魂衰微忽與鬼神遇相觸突

致之為其所排擊輕者因而發危重者多死也

出第二十卷中

肘後鬼擊之病得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名鬼排治之方

足臍上一寸七壯及兩踵白肉際差千金

又方 執艾如鴨子大三枚以水五升煮取二升頓服之

並出第一卷中

又方 粉一撮於水中攪飲之

滿急肘

備急肘

又方 以清苦酒吹令人兩鼻孔中

肘後同並出第一卷中

備急療鬼擊方 燒鼠屎末如黍米許水和服不能飲以水和少許內喉中

肘後仲同

又方 升麻 獨活 桂心 各等

右三味為末酒服方寸匕立愈

肘後

又有諸丸散並在備急條中今並頭實見人忽被神鬼所擊刺攪悶者或犯其行伍或遇相觸突或身神散弱或近傷所召輕者難免重者多死猶如周宣燕簡輩事不為虛也必應死者亦不可療要自不得不救之耳

肘後同並出第一卷中

刪繁倉公散方 特生礬石

燒半日研是也

灸去雄黃研藜蘆熬

右四味等分搗為末主療卒鬼擊鬼排鬼

刺心腹痛下血便死不知人及臥壓嚙腳踵不覺者諸惡毒氣病取前散如大豆許以管吹入鼻中得

嚏則氣通便活若未嚏復更吹之得嚏為度此藥能起死人漢文帝太倉令馮子意以此方療如前病

勝餘方若別疾不若玉壺丸等法

崔氏備急方注等

千金翼療鬼擊方 炙臍下一寸三壯

出第二十卷中

尸厥方一十二首

尚德按病源陰陽俱虛下有者字應字下有尸厥二字宋本同

尚德按要略無此字

尚德按注肘後作虛

尚德按肉肘後作肉中穴二十壯

病源尸厥者陰氣逆也此由陽脈卒下墜陰脈卒上升陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如

死猶微有息而不常脈尚動而形無知也聽其耳內猶猶有如嘯之聲而股間暖者是也耳內雖無嘯聲

而脈動者故當以尸厥瘵之診其寸口脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏身溫而汗此為入腑

雖卒厥不知人氣復則自愈若脣正青身冷此為入臟亦卒厥不知人即死候其左手關上脈陰陽俱虛

足厥陰足少陽俱虛也病若恍惚不知人妄有所見觀字下宋本有也出張仲景云尸厥脈動而無氣氣閉不通故靜而死也治方 薑蒲屑納鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌

下方 取左角發方寸匕燒末酒和灌令入喉立起

肘後方 白馬尾二七莖白馬前脚甲二枚燒之以苦酒丸如小豆大開口吞二丸須臾服一九

又方 灸鼻人中七壯又灸陰囊下去下部一寸百壯若婦人灸兩乳中又云爪刺人中良久又針人中

至齒立起此扁鵲法

又方 以繩圍其臂脫男左女右繩從大椎上度下行脊上灸繩頭盡處五十壯活此是扁鵲法

又方 灸其兩脇下取炷中墨如彈丸大數和飲之更以管吹耳中令三四入更五次之

又方 以小管吹鼻孔梁上塵如豆大著中吹之令人

又方 針百會當鼻中人髮際五寸許針入三分補之針足大指甲下肉側去甲三分又針足中指甲上

各三分大指之肉去端韭葉許又針手少陰銳骨之端各一分

又方 灸臚中季肋間二七壯也肘後推云灸臚中畢

千金論曰風寒之氣客於臚間滯而不能發故瘡不能言及喉痺失聲皆風邪所為也入臟腎能殺人凡

尸厥如死脈動如故此陽脈下墜陰脈上爭氣閉故也瘡方 灸百會百壯鍼入三分補之



又方 鍼足中指頭去甲如韭葉並刺足大指甲下內側去甲三分

崔氏論曰凡尸厥為病脈動而形無所知陽脈下墜陰脈上爭榮衛不通其狀如死而猶微有息其息不  
常人乃不知欲濟者療之方 急可以蘆管吹其兩耳極盡以氣吹之立起若人氣極可易人吹之

中卷

中蠱毒方二十一首

高德按蠱  
病源作蟲

又按面字  
下病源有  
色字宋本  
同

又按親病  
源作聯  
又按從病  
源作野聞

病源凡蠱毒有數種皆是變惑之氣人有故造作之多取蠱蛇之類以器皿盛貯任其自相噉食唯有一  
物獨在者即謂之為蠱便能變惑隨逐酒食為人患禍患禍於他則蠱主吉利所以不羈之徒而畜事之  
又有飛蠱去來無由漸狀如鬼氣者得之卒重凡中蠱病多起於死以其毒害勢甚故云蠱毒者蠱毒而  
青黃者是蛇蠱其脈洪壯病發之時腹內熱悶胸脇支滿古本脈強不喜言語身體常痛人心腹如似蟲  
行顏色赤唇口乾燥經年不治肝膈爛而死其面色赤黃者是蛇蠱蠱其脈浮滑而短病發之時腰背微  
滿手脚唇口悉皆青習而喉脈急舌上生瘡二日不治噉人心肝盡爛下膿血羸瘦顏色枯黑而死其  
面色青白又云其脈沉濡病發之時咽喉塞不欲聞人語腹內鳴喚或上或下天陰雨轉劇皮內如蟲行  
手脚煩熱嗜醋食飲噉膿血顏色白白乍青腹內脹滿狀若蝦蟆若成蟲吐出成科斗形是蝦蟆蠱經年  
不治噉人脾胃盡唇口裂而死其脈緩而散者病發之時身體乍冷乍熱手脚煩疼無時節吐逆小便赤  
黃腹內悶胸痛顏色多青毒或吐出似蜣螂有足翅是蜣螂蠱經年不治噉人血脈枯盡而死欲知是蠱  
與非當令病人唾水內沈者是蠱浮者非蠱又云旦起取井花水未食前當令病人唾水內唾如柱脚直  
下沉者是蠱毒沉散不至下者草毒又云含大豆若是蠱豆脹皮脫若非蠱豆不爛脫又云以鵠皮置病  
人卧下勿令病人知若病劇者是蠱也又云取新生雞子煮熟去皮留黃白令完全日晚口含以齒微噉  
勿令破作兩炊時夜吐瓦上著霜露內且看大青是蠱毒也昔有人食新變鯉魚中毒病心腹痛心下發  
發熱煩寬欲得水洗洗身體蠕動如魚得水狀有人診云是蠱其家云從無此毒不作蠱治遂死其湯熨

相承四字  
宋本同  
又按病源  
又作又下  
同病作痛

通按病源  
電字下有  
陰字先非

又按千金  
皆於作皆  
有以作二

字作俗字  
又按作父  
千金作按

便大三字  
尚按千金  
金腹作身

近作延日  
二字

宋本再以  
作不淨清  
字下有  
利二字  
尚按按合  
病六字  
後作便去

鍼石別有正方補養寧導今附於後養生方導引法云兩手著頭相入坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝  
中痛低頭入膝間兩手交又頭十二通愈蠱毒及三尸毒腰中大氣又云常度日月星辰清淨以雞鳴安  
身臥漱口三咽之調五臟殺蠱蟲令人長生治心腹病又云治百病邪蠱當正臥閉目閉氣內視丹田以  
鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐之勿令有聲令人多出少以微為故存視五臟各如其形色又存胃  
中令鮮明潔白如素為之倦極汗出乃止以粉粉身摩持形體汗不出而倦者亦可止明日復為之又當  
存作大雷電光走入腹中為之不止病自除

千金論曰蠱毒千品種種不同或吐下鮮血或好臥闇室不欲見光明或心性反常乍喜或四肢沉  
重百節酸疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其死時皆於九孔中

或於脇下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蟲猶鬼狐狸老物精魅水不敢  
若人養生之家大須慮此以下亦有灸法初中蠱於心下作艾炷灸一百壯並主猶鬼亦灸得差

以字下字下有  
捺便大三字  
又論曰世有拙醫見患蠱脹者偏腹腫滿四肢如故小便不甚澀以水病療之近服水藥經五十餘日望  
漸痊愈日復增加奄致殂殞如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千卷不盡其理所  
以不可一一備述云爾

廣濟療蠱毒方服此升麻散三四日後即服前光砂丸方  
升麻 桔梗 桔萸 右三味搗為散  
以熟湯洗所患人陰中再以濃汁服方寸匕日二服漸加至二匕內消忌粘食猪肉

肘後療中蠱毒諸方人有養畜蠱毒以病人凡診法中蠱狀令人心腹切痛如有物齧或吐下血不即療  
之食人五臟盡即死矣欲知是蠱與非當令病人唾水沉者是浮者非也  
又欲知蠱主姓名方 取鼓皮一片燒灰末以飲服病人須更自當呼蠱主姓名可語令知便即去病愈  
矣亦有以蛇涎合作蠱毒著飲食中使人得癘病此一種積年乃死療之各自有藥江南山間人不可



則便四字

尚連按千金  
金鼓作樓  
蘇微作盛  
較

尚連按三  
枝千金作  
一枝

如常法三  
字宋本作  
諸難處  
生遊冷水  
等九字

一日宋本  
作旦

鵠字下宋  
本有身字

不信之

又方 以葭苈密著病人臥席下亦能令呼蠱主姓名也大仲備急千金並

小品療蠱方 蝟皮廣五寸蠱微根五寸如足鉗指大細右二味以水一升清酒三升煮取一升頓服

之當下蠱即愈千金古令錄驗同

又方 土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下古今錄

又方 皂莢三挺長一尺者炙去皮子美酒一升漬一宿去滓頓服古今錄驗范汪同時後

又方 取薺危根搗為末以飲服方寸匕古今錄

千金犀角丸療蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方 犀角末羚羊角末鬼臼 桂心各四天雄炮莽草

炙真珠研雄黃研兩各麝香研兩 貝齒燒灰五兩射罔如雞子巴豆五十粒去 右十三味各

搗合篩之以蜜和為丸如小豆大服一丸不知增一丸卒得腹中痛飛尸服如大豆二丸若惡氣腫以

苦酒和以塗之其良以絳囊盛藥繫男左女右臂辟惡可以備急療萬病也忌如常法范汪同出第二

卷十五

千金翼療蠱毒方 櫟木北陰白皮一大握長五寸以水三升煎取一升空腹服之即吐蠱出也並療蠱

下血出第十

崔氏療蠱方 黃瓜樓根乾者二兩搗以綿裹酒一升漬一日去滓溫服之少時即吐利蠱即出後煮粥

飲服一兩蠱吐利即斷不斷即煮人參甘草炙生薑各一兩服之此根唯山南者好出第三

備急療蠱方 取白鵠毛燒灰以飲和服之良

又療蠱方人家雖藏此方而不知如此效驗 搗生栝樓根取汁一升醬汁少許和溫服之須臾吐蠱出

試驗並出第十

必效療蠱毒大仲驗方 大戟 桃白皮東引者以王伯去足起 右三味搗篩為散以冷水服半方寸

尚德接毛  
肘後作端  
宋本同

名字下家

本有忌藥

笋猪肉等

高德接足

下二分二

字疑衍

如常法宋

本作生血

猪肉冷水

尚德接毛

病後作端

尚德接毛

自和肘後

作自當時

匕一服其毒即出未出更一服蠱並出李饒州法云奇效若以酒中得則以酒服若食中得以飲服之  
崔氏千金同肘後云斑毛一分桃皮大戟各二分和棗核大  
米清飲服吐盡十日不差更一服千金崔氏云服八粒

又方 胡荽根搗取汁半升和酒服之立下

又方 取木鑽相思子二七枚搗碎為末煖水半盞和攪頓服之今蠱即當欲吐抑之勿吐若耐不得即  
大張口吐之其毒即出出訖服稀粥勿食諸肉輕者但服七枚差無問年月深淺非常神效勿輕之

又試蠱法 取銀匙若筋或釵含之經宿色黑即是不黑者非  
出第三卷中

古今錄驗療蠱方 巴豆汁去皮煎去豉半升釜底墨方寸 右三味搗篩為散清且以酒服如醬頭大小行

蠱主當自至門勿應之去到家立自知其姓名

又雄黃丸主蠱毒中藥欲死方 雄黃研硃砂研藜蘆炙馬目毒公 皂莢炙去破莽草二分 巴豆去  
各二 右七味搗篩以蜜丸如大豆許服三九當轉下先利清水次出蛇等當煩悶者依常法可用鴨

美補之忌如常法

又療中蠱毒方 取牡丹根搗末服一錢七日三服至良忌胡荽注

又療中蠱胡洽方 以猪膽導下部至良肘後集驗注同並  
出第四十五卷中

蠱吐血方一十首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其相啖食除一存者名為蠱能害人食人腑臟其狀心切痛如  
被物啗或鞭面目青黃病變無常是先傷於膈上則吐血也不即治之食臟腑盡則死  
出第二十卷中

肘後療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方 蒿根 蘘荷根各三 右二味咬咀以水四升煮取二升去

滓頓服即愈又當自知蠱主姓名千金小品崔氏文仲  
備急古今錄驗同

又方 巴豆一枚去皮豉三釜底墨方寸 右三味搗分作三九飲下一九須臾當下蠱毒不下更服一九

小品必效集經文仲備急  
范汪同並出第三卷中

蠱吐血方一十首 蠱下血方九首



范汪療中蠱吐血方 麥麴二升熬以水服之令蠱當下蠱

又方 苦瓠一枚以水二升煮取一升分服當吐蠱如蝦蟆科斗之類苦瓠毒可臨時量用之附後千金小品文仲

備急古今錄驗同千金云苦瓠一分沿下血

又方 生桔梗搗取汁服二三升日三服牛膝根亦得並出第十卷中

文仲療中蠱吐血方 麝羊皮方三寸敗 鱗皮亦佳 苦參 蘘荷根兩 黃連 當歸略二 右五味切以水七升煎

取二分分三服備急集驗同方有苦瓠

又方 取桑木心剉一斛於釜中以水淹之令上有三寸煮取二斗澄取清又微火煎得五升宿勿食且

服五合則吐蠱毒崔氏集驗古今錄驗同

又方 雄黃研 釜月下黃土 懶杆炙各斑猫十四枚去足翅熬 右四味搗末以粥漿服之分為三四服則吐

蝦蟆小品同古今錄驗方有大黃如棗大或吐蝦蟆及蛇等物餘與范汪同

崔氏療中蠱吐血方 雄黃研 丹砂研 麝香一兩 右三味搗篩為散旦以井花水服一刀圭當吐蠱毒

忌生血物狸肉附錄集 凡蠱有數種而人養作者最多也郡縣有名章者尤甚今東有句章章安故鄉

南有豫章無村不有無縣不有而不能如此之甚耳非唯其飲食不可噉乃至目色之已入人類此輩

小易療復有自然飛蠱狀如鬼氣者難療此諸種得真犀角麝香雄黃為良藥人可常帶此亦預防之

易有蠱卦又子產所說並以器皿中蠱為蠱今者凡皿上安一虫字或作出邊大非體也並非第

小品療中蠱心痛吐血欲死方 鹽一升鴻苦酒一升煮令稍和一服立吐蠱毒出已用良驗附後文仲備急古今

錄驗同出第四卷中

蠱下血方九首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其自相食噉餘留一存者為蠱能變化為毒害人有第之以毒

害多因飲食內行之人中之者心腹煩痛煩毒不可忍食人五臟下血瘀黑如爛雞肝附後千金小品文仲

宋本豫章下有略字入作亦凡作煩

尚從樓十金若錄一收寸字下宋本有得字服字下宋本有忌蠱肉冷水五字

五字下宋  
本有林字

同前方宋  
本作雞肉  
六字  
尚德按千  
金屑作生  
一作二

尚德按  
根皮下千  
金屑各五  
兩三字

之字下宋  
本有忌衛  
物七字

小品療蠱毒腹痛注下赤血踰躅散方 羊躄躅 乾薑 藜蘆 附子 炮 巴豆 去皮野葛皮 肉桂

丹砂 研 雄黃 研 蜈蚣 一分 右十味搗為散以水服一刀圭不知加一粟米忌猪肉蘆葦生血物生葱

裡肉 結冷 錄

又療蠱下血欲死方 舊按根 牛膝 五 連翹子 升 臘 按臘疑當作蠟 尚德 右四味切以水四升煮取

三升分三服即愈 古今錄

又療諸蠱大便下血日數十行方 巴豆 枚 七 藜蘆 炙 附子 炮 羌青 去足 礬石 各二分 右五味搗下篩

別研巴豆如膏和相得以綿裹一大豆許內下部中日二三愈忘同前方 千金古今錄 同

千金凡忽患下血以上件方療更滑利者此是中蠱其下血狀如鴨肝腹中絞痛急者此方主之 蒿根

升麻 屑角 兩 地榆 白蘘荷 各四 桔梗 黃柏 黃芩 兩 右八味切以水九升煮取二升半

分三服

又凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒相醫以斷痢處之此大非也

又療中蠱毒吐血下血皆如爛雞肝令人心腹絞切痛如有物嚙若不即療令人五臟盡乃死驗之法欲

知是蠱令病人唾水中沉者是蠱浮者非蠱也方 檳木北陰白皮 桃根皮 蠅皮 援 一方 亂髮灰 方

寸生麻子 升 五 右五味先煮檳皮桃根取濃汁一升和麻子汁亂髮灰蠅皮木等令病者少食且服

一升隨啖著盆水以雞卵攪吐水中如牛涎漬胎及諸蠱毒之物 五卷中

千金療蠱毒下血方 蠅皮燒灰以水服方寸匕當吐蠱毒 出第十 五卷中

崔氏療中蠱下血及毒下冷辛皮湯方 雞羊皮 枳 藜蘆 根 兩 苦參 黃連 各二 當歸 升麻 犀角

各三 右七味切以水九升煮取三升分三服無蘘荷根以蒿根代之

又療中蠱毒瀉日夜腹痛無度不可忍方 取白蘘荷葉四五枚私內著病人眠臥處席下勿令病人

知之若為蠱毒所傷則不肯在上眠即知是蠱毒為病用是葉三挺炙令皮度子打碎用磁甕醃四升於



變器中候日正午時滴其英又以新白布三尺蓋上布上又積一口食刀正對病人眠牀下安之至來日午時取藥用蓋藥布濾去滓分三服每服相去如人行十里久若不肯服可將鐵刺兩手大姆指端甲亦不勞深其鍼且勿拔出病人當自服藥毒或吐或大便中出除其血即斷腹痛亦除此方用皆驗

並出第  
三卷中

古令錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜下石餘血四藏悉損唯心未毀或乃鼻破待死方 桔梗梔末以酒服方寸匕日三不能下藥以物揭口開灌之心中當煩煩史自靜有項下蠱至服七日止當服猪肝臙以補之

出第  
四卷中

### 五蠱方一十二首

尚捷捷又  
千金作又

久按千金  
卷作卷二  
作一三枚  
作二枚  
作蠱下七  
日後作下  
後七日

千金太上五蠱方主百蠱吐血傷中心腹結氣或堅氣塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疾寒戰夢與鬼交狐狸作魃卒得心痛上又胸脇痛如刀刺經年累歲暑熱不起卷主之方 雄黃 礞石 椒目 藜蘆 豆豉 鬼白 莽草 芫花 蘇合 蘇合 礞石 分  
蠱肝 二 附子 五 蛇去皮 蜈蚣 三 枚 斑蝥 翅 三 枚 去 右十三味搗末蜜和更搗一二千杵每服如小豆一丸餘悉封勿泄十九丸為一劑如不中病後日增一丸以下利為度當下蟲種種狀貌不可具數下七日後將息服一劑三十年百病盡除忘五辛猪肉冷水生血物狸肉蘆笋等

又方 酒服桔梗犀角末方寸匕日三服不能自服揭口與藥下心中當煩煩史自靜有項下至七日止當食猪脾以補之

並出第  
二卷中

崔氏療五蠱毒方

一曰蛇蠱食中得之咽中如有物噦之不入吐之不出悶亂不得眠心熱不能食方 服馬兜鈴根即吐出又服麝香方寸匕亦自消或吐也

二曰蜈蚣蠱得之胸中忽然或哽入咽怵怵如蟲行欬而有血方 服雞肫脂即下或吐或自消也

尚捷捷又  
千金作又

三曰蠅蟻蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食咽氣喘而氣發方 服車脂半升即出  
四曰科斗蠱同上法甚驗

五曰草蠱術在西涼以西及嶺南人多行此毒入人咽喉痛求死方 服甘草藍汁即自消

又方 五蠱共一法療之但取產婦胎衣切之暴乾為散水和服半錢匕五毒自消

又方 含升麻蟬汁

又方 五蠱都服馬兜鈴苗似蘿摩草形正直上取雞子大搗為散服半錢匕或至一匕五蠱毒之病多在喉中常煩記之或小醫不識此病言冷蛇動或浪稱是注灸刺浪服諸藥枉死也此由醫生未經

歷故也宜令審別之

古今錄驗五蠱湯方

煮取二升分為三服 犀角三錢 黃連 綠草 當歸 略二 羚羊皮 方二 右六味切以水七升

又五蠱下利去膏血赤屬九方

服一丸如下利不止以清粥汁止之不下小增之欲令陰除不令天下 范注周並出第四十五卷中

蠱注方三百

病源蠱注者住也言其病遲滯停住死又注易傍人也蠱者是聚蛇蠱之類以器皿盛之令其自相噉食

餘有一箇存者為蠱也而能變化人有造作欽事之者以毒害於他多於飲食內而用用之中者心悶

腹痛其食五臟盡則死有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月遊走腹內常氣力羸瘦骨節沉

重發則心腹煩煩而痛令人所食之物亦變化為蠱漸侵食腑臟盡而死死則病流注染毒傍人故為蠱

注也 出卷二十

范汪療蠱注百病瘕瘕積聚酸削骨肉大小便不利辛枵濕惡風腫脹服滿淋水轉相注殫明盡尸延及

男女外孫醫所不能療更生十七物紫參九方 紫參 人參 半夏 洗 藜蘆 代赭 桔梗 白薇

小 必 要 卷二十八 藏王方三百 藥事記卷分九



尚能按于  
金名萬病  
又按按于  
金作蠟  
又按按于  
下疑脫第  
宇  
華宋本作  
三服下末  
本有忘生  
血物四字

尚能按于  
乾千金作  
蠟蛇  
本有忘生  
慈狸肉五

肉從容分三石膏大黃分一牡蠣一分丹參分一蝦蟆及烏頭狼毒分一附子分五巴豆七枚去  
右藥搗篩蜜和為丸以飲下如小豆一九日三服老小以意減之蜂蠱所螫以塗其上神良忌羊肉冷  
水一方與蝦蟆有乾蠟中

小品雄黃九療毒注四肢浮腫肌膚消索絞逆腹大如水狀漏泄死後注易家人方一名蠱脹方 雄黃

研已豆 莽草炙鬼臼分三蜈蚣三枚 右五味搗篩為末蜜和更搗三千杵藥成蜜器封之勿令泄

氣宿勿食服如小豆一九不知加一九當先下清水蠱長數寸及下蛇或如壞雞子或白如膏下訖後  
作葱豉粥啖之補之忌生魚生菜豬肉蘆笋冷水煖食將養也千金同出

集驗療鬼注毒氣變化無常絞魚皮散方 絞魚皮鰐魚皮是犀角 麝香 研龍骨 丹砂 研雄黃 研

蕤荷葉 鹿角一分蜈蚣一枚 椒汗 乾薑分一貝子枚雞古香分一 右十三味搗篩為散空心酒服一

錢七日三服中

蠱毒雜療方五首

小品瘡蠱似蛇方 雄黃 研麝香 研 右二味各如大豆許取生羊肺如指大以刀開取雄黃等末以肺

裹吞之崔氏集驗古

又療人食菜及菓子中蛇毒方 大豆末以酒漬取汁半升服之又以雞血和真鐵精吞如梧子大一丸

結吟

又療有人食新變魚取飽中毒病心腹痛心下堅發熱煩冤欲得水沃身動搖如魚得水狀有人診病云

是蠱家云野中相承無此毒不作蠱瘡之速死 出第

千金療人得熱雜蠱方 斑蝥六枚桂心一片如 釜月下土如彈 右四味搗篩水服一錢

七下蠱蛇蝦蟆蜈蚣白蠱

又療有人中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝虛狀無常方 犀角 芍藥各一黃連二兩梔子一兩

字  
尚德接千  
金梳子仁  
七枝給作  
殺以水九  
升煮取三  
升分三服

尚德接千  
有雜字宋  
本在字  
下  
又按千金  
碑砂二錢  
通按補粉  
未詳

尚德接千  
下則在經  
下有舊云  
二字此下  
通復得作

仁十義荷葉四兩 牡丹皮兩 羚羊皮方廣五寸 右七味切以水五升煮取一升半去滓分溫再服今錄

驗同出第二十五卷中 服字下宋本有忌 豬肉冷水五字 又按出字上疑服並字

古今錄驗療食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方 爐中取鐵精細研別搗為雞肝和之丸如梧子大以酒服三九日三服甚者不過十日愈微者便愈附後漢氏同出第四十五卷中

貓鬼野道方三首

病源貓鬼者云是老狸野物之類變為鬼蜮而依附於人人畜事之猶如事蠱以毒害人其病狀心腹刺痛食人腑臟吐血痢血而死又野道者是無主之蠱也人有畜事蠱以毒害人為惡既積乃至死滅絕其蠱則無所依止浮遊田野道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以其於田野道路得之故謂之野道並出第二十五卷中

千金療貓鬼野道病歌哭不自由方 五月五日取自死赤蛇燒作灰研并花水服方寸匕日一服

又療貓鬼眼見痛瞼並耳有所聞方 相思子 草麻子 巴豆各一 硃砂未 蠟銘四 右五味搗作丸

取麻子許含之即以灰圍患人前頭著一斗灰火吐藥火中又按中字下千金有沸字宋本同 即盡火上作十字其貓

鬼並皆死矣忘 瘡肉蘆芽生血物翼方有峭粉出第二十六卷中

古今錄驗療妖魅貓鬼病人不肯言鬼鹿角散方 鹿角屑搗散以水服方寸匕病者即言實也出第四十五卷

自縊死方一十五首

病源人有不得意志者多生忿恨往往自縊以繩物繫頸自懸挂致死呼為自縊若覺早雖已死徐徐抱下其陰陽經絡雖暴擁閉而臟腑真氣故有未盡所以猶可救療故有得活者若見其懸挂便忽遽截斷其繩則不可救此言氣已旋閉絕忽暴斷其氣雖通而奔並逆悶氣則不能遂即不復得生又云自縊死且至暮雖已冷必可活晨至旦則難療此謂其盡則陽感其氣易通也夜則陰感其氣難通也又云夏則



宋本無字  
下句作字  
二字

尚德按微  
要略作數  
又按極疑  
皆作強  
又按乃要  
皆作吸  
通按微耗  
音罷按微  
毛成席席  
者

夜短又熱則易活又云氣雖已斷而心微溫一日以上猶可活也出第二十三卷中

肘後葛氏療自縊死心下尚微溫久猶可活方 徐徐抱解其繩不得斷之懸其髮令足去地五寸許塞

兩鼻孔以蘆管內其口中至咽令人噓之有項其腹中驚驚轉或是通氣也其舉手傍人當益堅捉持

更逆噓之若活了能語乃可置若不得懸髮可中分髮兩手牽之

又方 起焚末葱葉吹其兩鼻孔中逆出腹內之千金備急文仲同

又方 以蘆管吹其兩耳極其易人吹取活乃止若氣通者以少桂湯稍稍噓之徐徐乃以少粥清與之

並出第三卷中仲景云自縊死旦至森雖已冷必可療森至旦小難也恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶

應可療又云心下若微溫者一日以上猶可活徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以腳踏其兩

肩手小挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胸上微動之一人摩捋臂脰屈伸之若已僵但漸漸強屈

之並按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿若勞之須令可少桂心湯及粥清含

與之令濡喉漸漸能嚥乃稍止兼令兩人各以管吹其兩耳彌好此最善無不活者並皆療之附後備急文仲古今

錄驗備急方 以罽衣若氈氈厚既物覆其口鼻抑之令兩人極力吹其兩耳一炊頃可活也附後千金文仲集驗小品同

又方 懸牽其頭髮塞兩耳勿令通氣以葱葉刺鼻中兩人極力痛吹之噓其兩腳踵即活亦可塞鼻而

吹口活也小品古今錄驗同

范汪療自縊死方 懸其髮令足截至地一時許即活

又方 急手掩其口鼻勿令內氣稍出二時許氣至即活備急文仲古今錄驗附後同

又方 以絹急絞身體令堅以車牛載行三十里許使人於車上行踏肩引髮吹耳

又方 以松子油內口中令得入咽中則便活

千金瘡自瀝死方 以藍青汁灌之又極須安定身心徐徐緩解慎勿割繩胞取心下猶溫者刺雞冠血

滴口中即活男用雞女用雄雞

又方 雞尿白以漿許酒半盞和灌口鼻中即活

又方 梁上塵如大豆各內一筒中四人各一筒同時吹鼻中兩耳極力吹之即活

又方 尿鼻口眼耳中並捉頭髮一撮如筆管大擊之立活並出第二十六卷中

刪繁瘳五絕死方 一曰自縊二曰牆壁所迫三曰溺水四曰魘魘五曰產乳皆取半夏一兩搗篩吹一

大豆內鼻孔中即活心下溫一日者亦可活千金同

### 執喝方之首

尚書經傳  
千金作此

病源夏月炎熱人多冒涉途路執毒入內與五臟相並客邪熾盛鬱於不宣致陰氣卒絕陽氣暴擁經絡不通故奄然悶絕謂之喝也然此乃外邪所擊真藏未壞若遇便療救氣宣則蘇也夫執喝不可得冷得冷便死此謂外邪卒以冷觸其熱氣積於內不得宣發故也又冒執困乏候人盛暑之時觸冒大熱執毒

之氣入藏則悶鬱至至於困乏也並出第二十三卷中

肘後夏月中執喝死凡中喝死不可使得冷得冷便死療之方 以屈草帶繞喝人臍使三四人尿其中

令溫亦可用泥土屈草亦可加瓦椀底若脫車缸以著喝人臍上取令尿不得流去而已此謂道路窮

急無湯當令人尿其中仲景云欲使多人尿取令溫若有溺便可與之仲景云不用泥及車缸恐此物

冷喝既在夏月得熱土泥暖車缸亦可用也備急大仲景方小品千金同

又方 笑雨乳頭各七壯千金

又方 取道中熱塵土以積喝人心下多為佳少冷即易通氣也千金同

又方 搗葛蒲汁飲之一二升

又凡此療自經溺喝之法並出自張仲景為之其意理殊絕非常情所及亦非本草之所能開悟實極



外臺祕要

卷二十八

救人之大術矣傷寒家別復有喝病在上仲景論中非此過熱之喝文仲同出第七卷中

千金療熱喝方

可飲熱湯亦可用少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍嘔勿頓使飽但以熱土及熱灰土擁其上佳

古令錄

文仲療夏月喝死方

沈者麥汁灌三升不差更灌之

肝後千金同

古令錄驗療熱喝方

令人口虛心前令暖易人為之

肝後同

溺死方凡首

病源人為水所投溺水從孔竅入灌注肺腑其氣擁開故死早拯救得出即泄漚其水令氣血得通便得

活又云經半日及一日猶可療氣若已過心下暖者亦可活

出第二十卷中

肘後療溺死一宿者尚可活方

以皂莢末綿裹內下部中須臾出水則活

古令錄

又方

倒懸解衣挑去腦中垢極吹兩耳即活

其驗千金小品

又方

倒懸死人以好酒灌鼻中立活

千金備急文仲

又方 取甕傾之以死者伏甕上令口臨甕口燃以燼火二七把燒甕中當死人心下令煙出小入死者

鼻口中鼻口中水出盡則活燼盡更益為之取活而止常以手候死人身及甕勿令甚熱冬天常令火

氣能使死人心下得煖若平無甕可就岸穿地令如甕燒之令煖乃以死人著上亦可用車轂為之當

勿隱其腹及令得低頭使水出并熱灰數斛以粉身濕即易千金

小品療溺死若身尚暖者方

取甕中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔即活

備急千金

又方 便脫取暖釜覆之取溺人伏上腹中出水便活也

肘後同並出第十卷中

千金療落水死方

以甕中灰布地令厚五寸以甕側著灰上合死人於甕上使頭小垂下炒鹽二方寸

已內管中吹下孔中即當出水水下因去甕以死人著灰中擁身使出鼻口即活矣

又方

掘地作坑中熱灰數斛內坑中下死人覆灰濕微即易之勿令灰熱烙膊人冷即易之半日即活

尚能按  
病源  
宋本同  
又按病源  
作上

又按千金無  
路字宋本同

備急療溺死方

屈死人兩脚著人肩上以死人背向生人背負持走吐出水便活

附後云亦治凍死  
金附後文仲集驗小

品古今錄驗同  
出第八卷中

凍死方一首

病源人有在途路逢淒風苦雨繁霜大雪衣服霑濡令氣入藏致令陰氣開於內陽氣絕於外榮衛結澀不復流通故致噤絕而死若早得救療血溫氣通則生又云凍死一日猶可活過此即不療

出第二十卷中

附後療冬天墮水凍四肢直口禁裁有微氣出方

以大器中多熬灰使煖囊盛以薄其心上冷即易心

煖氣通目則得轉口乃開可溫尿粥清稍含之即活若不先溫其心便持火炙其身冷氣與火相搏

則死

集驗備急文仲  
金古今錄驗同

人井塚悶方二首

肘後云此事他方少有其說且人為之寡不俟別條今於水凍之後附此乃是地氣薰蒸蓋亦障霧之例

服諸解毒犀角雄黃麝香之屬豉豆竹瀝并麻諸湯亦應為佳

出第三卷中

小品療人井塚悶冒方

凡五月六月井中及深塚中皆有伏氣入中令人鬱悶殺人如其必須入中者

先以雞鴨雞鳥毛投之直下至底則無伏氣毛若徘徊不下則有毒氣也亦可內生六畜等置中若有

毒其物即死必須人不得已當先以酒若無以苦酒數升先灑井塚中四邊畔停少時然後可入若覺

中有些氣鬱悶奄奄欲死者遂取其中水灑人面令飲之又以灌其頭及身體即活若無水取他水用

也

附後千金錄驗  
出第十卷中

千金療人井塚毒氣方


取他井中水灑身上至三食頃便活若東井取西井南井取北井中水用之

出

卷中









W 2467. W

1915

V, 26-28